



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

“PASIÓN POR EDUCAR”.

---

---

**" CRUCIGRAMA "**

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL

ASIGNATURA:

URGENCIAS PEDIATRICA

PRESENTA

**BERSAIN ZACARIAS RODRIGUEZ**


BAJO LA DIRECCIÓN DE:

DR. JUAN CARLOS RIVERA ARIAS

CUNDUACAN, TABASCO, A 06 DE DICIEMBRE DE 2020

# CRUCIGRAMA

## HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL



### HORIZONTAL

- 1.- Es la pérdida sanguínea provocada por una lesión situado en el tracto gastrointestinal, en un punto localizado por encima del ángulo de Treitz.
- 2.- La HDA se manifiesta habitualmente en forma de hematemesis o deposiciones.
- 3.- Es recomendable practicar la endoscopia de forma precoz, en las primeras 4 a 6 h, a los pacientes con hemorragia.
- 4.- Requiere de una extravasación de al menos 60-100 ml de sangre en el tubo digestivo alto.
- 5.- Permite una infusión de fluidos o sangre más rápida que una larga vía central, tiene que ser grueso y corto.
- 6.- Ante un paciente con sospecha de hemorragia digestiva debe llevarse a cabo un examen inicial con historia, un examen físico y una evaluación.
- 7.- Debe ser llevada a cabo por un endoscopista asistido por personal de enfermería adiestrado en endoscopia terapéutica y en una dependencia dotada del material necesario para realizar una reanimación urgente si es necesario.
- 8.- Es la exteriorización, a través del ano, de sangre roja fresca o de color rojo oscuro. El color de las heces no siempre es un indicador fiable del origen de la hemorragia.
- 9.- Se debe reponer con cristaloides (solución salina fisiológica o Ringer Lactato) o coloides (gelatinas, dextrans, etcétera) a un ritmo adecuado para evitar la hipoperfusión de los órganos vitales.
- 10.- Permiten un abordaje multidisciplinar de este problema, incluyendo la disponibilidad de una endoscopia con experiencia en técnicas de hemostasia y el apoyo de personal de enfermería entrenado.

### VERTICAL

- 11.- Es de origen varicosa no es de las más frecuentes, pero sus tasas de morbilidad y mortalidad son particularmente elevadas.
- 12.- Es procedente de las fosas nasales o del territorio broncopulmonar puede ser deglutida y posteriormente vomitada en forma de hematemesis fresca o en "poso de café".
- 13.- Es un tratamiento que se les da a todos los pacientes que han sufrido una HDA por úlcera péptica hasta lograr la cicatrización de la lesión.
- 14.- Es mejorar el transporte de oxígeno a los tejidos, que puede verse comprometido en caso de anemia extrema.
- 15.- Siempre que el paciente lo requiera por su situación hemodinámica, se deben priorizar las medidas de...
- 16.- Se debe plantear en caso de recidiva tras un segundo tratamiento, o en caso de recidiva masiva tras un primer tratamiento endoscópico, o como tratamiento inicial en hemorragias masivas en las que no se consigue la estabilidad hemodinámica inicial con reposición intensiva de la volemia.
- 17.- Se le denomina al vómito de sangre fresca, coágulos sanguíneos o restos hemáticos oscuros ("poso de café") y melena a la emisión de heces de color negro intenso y brillante, blandas y muy malolientes.
- 18.- Es un factor importante que también ensombrece el pronóstico.
- 19.- Es evidente cuando el enfermo ha presentado una hematemesis cuantiosa, melenas recientes y abundantes o rectorragia franca.
- 20.- Incluye medidas de tipo genérico, sea cual sea su origen, dirigidas a estabilizar la situación hemodinámica y otras medidas específicas que dependerán de la Hemorragia gastrointestinal 3 57 etiología.

# CRUCIGRAMA

## HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL

