



Nombre del alumno: Juliana Perez Mendez

Nombre del profesor: Elvia Patricia Castro Roche

Materia: Psicopatología II

Licenciatura: Psicología

PASIÓN POR EDUCAR

Villahermosa, Tabasco. octubre 2020

	Anorexia	Bulimia
Concepto	Es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad y estatura.	Es un trastorno alimentario por el cual una persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de alimento (atracones) durante los cuales siente una pérdida de control sobre la comida. La persona utiliza luego diversas formas, tales como vomitar o consumir laxantes (purgarse), para evitar el aumento de peso.
Origen	Es una enfermedad de origen mental. Existen factores biológicos.	Producto de varios factores que incluyen trastornos emocionales y de personalidad, tanto como presiones familiares, un posible desorden o sensibilidad genética o biológica.
Tratamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas para garantizar el consumo de nutrientes y calorías en cantidades adecuadas • Terapia psicológica • Para los adolescentes, terapia familiar • Controles médicos regulares 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluye psicoterapia - Medicamentos - Educación nutricional - Hospitalización

<p>Signos</p>	<ul style="list-style-type: none">• Amenorrea• Resultados anormales del análisis de sangre• Séquese o la descoloración de la piel (azulado o amarillento)• Enrarezca el pelo que fácilmente los interruptores o las caídas fuera• Arritmia (ritmo anormal del corazón)• Hipotensión• Edema periférico (hinchazón de armas o de tramos)• Densidad reducida del hueso• Deshidratación• Clavos quebradizos	<ul style="list-style-type: none">• Cambios en el peso (ascensos y pérdidas).• Intentos de hacer dieta y cambios frecuentes en el tipo de dieta.• Saltarse comidas para intentar paliar los excesos, así como episodios de ayuno.• Mal humor, cambios en el estado de ánimo o quejas de angustia y tristeza• Indicios de vómitos.• Uso de laxantes.• Patrón de ejercicio compulsivo alternado o no con etapas en que no se realiza actividad física.• Cambios en los hábitos de intercambio social (relaciones a veces muy intensas y también temporadas de soledad).• Compras de comida, "ataques" a la nevera o a la despensa. A veces restos de comida en el dormitorio u otros lugares inadecuados.
---------------	--	---

<p>Síntomas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de peso excesiva, o no lograr el aumento de peso previsto para el desarrollo • Aspecto delgado • Recuento de células sanguíneas anormal • Fatiga • Insomnio • Restringir estrictamente la ingesta de alimentos mediante las dietas o el ayuno • Hacer ejercicios de forma excesiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Atracones o sobre ingesta de alimentos • Uso de laxantes • Repetición • Baja autoestima. • La debilidad • Dolores de cabeza • Hinchazón del rostro por el aumento de las glándulas salivales • Problemas con los dientes, mareos • Pérdida de cabello • Irregularidades menstruales • Bruscos aumentos y reducciones de peso
<p>Semejanzas</p>	<p>-Entran en la categoría de trastornos alimenticios</p> <p>-El objetivo es conseguir la delgadez</p> <p>-Presencia de pensamientos negativos relacionados con la imagen, la ingesta</p>	<p>-Entran en la categoría de trastornos alimenticios</p> <p>-El objetivo es conseguir la delgadez</p> <p>-Presencia de pensamientos negativos relacionados con la imagen, la ingesta</p>

	<p>-Hay una insatisfacción corporal y una distorsión de la imagen corporal, suele ser más grave en la anorexia</p> <p>-El comienzo del problema es en edades tempranas, aunque algo inferior en la anorexia</p> <p>-Existen síntomas asociados como depresión y autoestima baja.</p>	<p>-Hay una insatisfacción corporal y una distorsión de la imagen corporal, suele ser más grave en la anorexia</p> <p>-El comienzo del problema es en edades tempranas, aunque algo inferior en la anorexia</p> <p>-Existen síntomas asociados como depresión y autoestima baja.</p>
Diferencias	<p>Se caracteriza por un miedo a engordar, acompañado por la sensación de verse y sentirse gordo/a, por lo que la persona deja de comer</p>	<p>La bulimia no sólo implica el componente del miedo a estar gordo o a engordar, sino que, además, el bulímico padece un sentimiento de descontrol ante la comida. Este come desmesuradamente y, puesto que se siente culpable, acto seguido se provoca el vómito.</p>