



**NOMBRE DEL ALUMNO: Marieli
Romero Curiel.**

**NOMBRE DEL PROFESOR: ELVIA
PATICIA CASTRO ROCHE.**

MAESTRÍA: Lic. Psicología.

MATERIA: PSICOPATOLOGIA II.

**NOMBRE DEL TRABAJO: CUADRO
COMPORATIVO.**

VILLAHERMOSA, TABASCO 15 DE OCTUBRE DEL 2020

	Anorexia	Bulimia
Concepto	Trastorno alimenticio que provoca que la persona se obsesione con su peso y lo que ingiere.	Trastorno alimenticio grave caracterizado por atracones, seguidos de métodos para evitar el aumento de peso. Trastorno alimenticio potencialmente mortal.
Origen	El ciclo destructivo comienza con la presión que el individuo siente por ser delgado y atractivo. El problema se centra, en una baja autoestima, en cierto tipo de familias disfuncionales.	El proceso de gestación de la bulimia comienza cuando existe algún grado de insatisfacción con el propio cuerpo, se encuentran las experiencias de rechazo social o de fracaso que se atribuyen al peso y los consejos de las amigas.
Conductas específicas	Distorsión de la imagen corporal, que impide al paciente reconocer el progreso de la delgadez.	Los atracones van seguidos de conductas compensatorias inapropiadas: vomito autoprovocado, abuso de laxantes o diuréticos, ayuno, o ejercicio físico excesivo. La percepción de la imagen corporal y del peso se suelen encontrar distorsionados.
Tratamiento	El tratamiento consiste en terapia, puede ser necesario un tratamiento médico para volver al peso normal. La terapia conversacional puede ayudar con la autoestima y los cambios en el comportamiento.	El tratamiento consiste en terapia profesional, medicamentos, y educación nutricional.
Signos	El aislamiento, cambiar hábitos en la relación a la comida, aumentar la actividad y ejercicio físico, quejas sobre la apariencia, cambios de humor.	El aislamiento, cambiar hábitos en la relación a la comida, aumentar la actividad y ejercicio físico, quejas sobre la apariencia, cambios de humor.
Síntomas	*Pérdida de peso excesivo o no lograr el aumento de peso previsto para el desarrollo. *Aspecto delgado. *Fatiga. *Insomnio. *Mareos o desmayos. *Vello suave como pelusa que cubre el cuerpo. *Cabello fino o quebradizo, o pérdida de cabello. *Saltarse	*Apetito desenfrenado. *Fatiga. *Deshidratación. *Vómito. *Ansiedad. *Culpa. *Acidez estomacal. *Ausencia de menstruación. *Depresión. *Altibajos emocionales. *pérdida de peso. *caries, mal aliento, o sequedad.

	comidas o rehusarse a comer con frecuencia.	
Semejanzas y diferencias.	<p>Las semejanzas entre bulimia y anorexia es que ambas son un trastorno alimenticio y la diferencia está en la forma en la que el paciente afectado se comporta ante la comida. La anorexia se caracteriza por un miedo a engordar, acompañado por la sensación de verse y sentirse gordo/a, por lo que la persona deja de comer. Por otro lado, la bulimia no sólo implica el componente del miedo a estar gordo o a engordar, sino que, además, el bulímico padece un sentimiento de descontrol ante la comida. Por consiguiente, éste come desmesuradamente y, puesto que se siente culpable, acto seguido se provoca el vómito.</p>	