



**NOMBRE DEL ALUMNO: MARIELI  
ROMERO CUIEL.**

**NOMBRE DEL PROFESOR: ELVIA  
PATRICIA CASTRO ROCHE .**

**MAESTRÍA: Lic. PSICOLOGÍA.**

**MATERIA: PSICOPATOLOGIA II.**

**NOMBRE DEL TRABAJO: CUADRO  
COMPARATIVO.**

VILLAHERMOSA, TABASCO 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

	DEPRESIVO MAYOR	DISTIMIA	CICLOTOMIA	BIPOLAR
CONCEPTO	Se caracterizan por una tristeza de una intensidad o una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad.	Depresión crónica del estado de ánimo.	Estado de ánimo inestable de forma persistente que implica numerosos periodos de depresión y de euforia leves.	Enfermedad orgánica crónica, que actúa sobre los mecanismos que regulan las emociones.
DIAGNOSTICO	1: criterios clínicos (DSM-5) 2: Hemograma, electrolitos y tirotrófina, vitamina B12 y folato para descartar trastornos físicos que puedan producir depresión.	Estado depresivo presente gran parte del día, la mayoría de los días, por al menos dos años. Un año en niños y adolescentes, que también pueden presentar un estado de ánimo irritable.	Durante el periodo de dos años citados, los periodos hipomaniacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha presentado síntomas durante más de dos meses seguidos.	Un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía dirigida a un objeto.
ESTRATEGIA DE INTERVENCION	Psicoterapia Fármacos Soporte.	Fármacos.	Tratamiento de sostén.	Fármacos.