



Mi Universidad

MEDICINA HUMANA.

Tema

**Actividad: "FARMACOS ALRTACIONES
ORGANICAS"**

Presenta

FRETH HIRAM GUTIERREZ DIAZ.

3ER SEMESTRE.

**San Cristóbal de las casas, Chiapas a
30 de noviembre del 2020.**

FÁRMACO	EFECTOS LEVES Y MODERADOS COMUNES	EFECTOS GRAVE	SISTEMA QUE RECURRETE
BETABLOQUEADORES	carbatación, fatiga, pesadillas, depresión, alucinaciones,	delirium y convulsiones. probablemente alcanzan el sistema nervioso central, por lo que pueden inducir delirium y síntomas psicóticos	Algunos betabloqueantes afectan principalmente al corazón, mientras que otros afectan tanto al corazón como a los vasos sanguíneos.
CLONIDINA	efectos adversos más frecuentes son boca seca (40%), somnolencia (40%), mareos (16%), sedación (10%).	Depresión, trastornos del sueño; mareo, sedación, cefalea; hipotensión ortostática; sequedad de boca, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor en la glándula salival; disfunción eréctil; fatiga	Las tabletas de clonidina de liberación-prolongada pueden tratar el TDAH al afectar la parte del cerebro que controla la atención y los impulsos.
HIDRALAZINA	hipotensión, que se manifiesta por mareo o fatiga.	sedación, euforia, ansiedad, hipomanía, confusión y convulsiones.	El daño a estos órganos puede causar enfermedades del corazón, un infarto, insuficiencia cardíaca, apoplejía, insuficiencia renal, pérdida de la visión y otros problemas.
THAZIDAS	pueden originar somnolencia y letargo, ataxia, temblor, ansiedad, depresión y estados confusionales	hipopotasemia, hiperuricemia, disfunción eréctil, disminución del flujo plasmático renal	Las tiazidas diuréticas actúan principalmente en el túbulo contorneado distal inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro.
Benzodiazepinas	Producen sedación, disminución de los reflejos,	deprimen el sistema nervioso central	Afectan al sistema nervioso central

	alteración de la coordinación, del control de los movimientos y de la capacidad de seguir un objetivo móvil.		
SALBUTAMOL	ansiedad, insomnio, inquietud motora, palpitaciones, temblores y cefaleas	frecuencia cardíaca rápida (taquicardia) o sensación de agitación o corazón palpitante (palpitaciones)	frecuencia cardíaca rápida (taquicardia) o sensación de agitación o corazón palpitante (palpitaciones).
TEOFILINA	irritabilidad, ansiedad, anorexia, cefalea, agitación, insomnio.	vómitos. aumento o aceleración de la frecuencia cardíaca. ritmo cardíaco irregular. convulsiones.	Puede dañar al corazón
CLOZAPINA	somnolencia. mareos, sentirse inestable o tener dificultad para mantener el equilibrio. aumento de salivación. boca seca. intranquilidad.	El efecto más complejo de tratar fue el aumento de peso.	inflamación del músculo del corazón que puede ser peligrosa) o cardiomiopatía (músculo cardíaco dilatado o más grueso que hace que el corazón deje de bombear sangre normalmente)
ARIPIPIRAZOL	Dolor de cabeza. nerviosismo. intranquilidad. mareos, sentirse inestable o tener dificultad para mantener el equilibrio. acidez.	sentir la necesidad de moverse constantemente e y problemas para dormir.	demencia (un trastorno cerebral que afecta la capacidad de recordar)

	estreñimiento. diarrea.		
HIDROMORFONA	dolor de cabeza, dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido, boca seca, aturdimiento, somnolencia, fuerte sudoración	puede ocasionar somnolencia	La hidromorfona puede ocasionar problemas de respiración graves o que pongan en riesgo la vida.

Medicine +