

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS

MATERIA: FARMACOLOGÍA


**DOCENTE: ALEJANDRA GUADALUPE
ALCAZAR RAMOS**

ALUMNO: MARCOS GONZÁLEZ MORENO

SEMESTRE Y GRUPO: 3°A

TEMA:

“FARMACOS EN LA LACTANCIA”

MEDICAMENTO	CLASIFICACIÓN	PATOLOGÍA	PRESENTACIÓN
Metformina	NIVEL 0	Seguridad demostrada	
Amitriptilina	NIVEL 0	Seguridad demostrada	
Levotiroxina	NIVEL 0	Seguridad demostrada	
Prednisona	NIVEL 0	Seguridad demostrada	
Teofilina	NIVEL 0	Seguridad demostrada	
Nifedipina	NIVEL 0	Seguridad demostrada	
Diltiazem	NIVEL 0	Seguridad demostrada	
Acetaminofén	NIVEL 0	Seguridad demostrada	
Lamotrigina	NIVEL 1	Probablemente seguro	
Aspirina	NIVEL 1	Probablemente seguro	
Dimenhidrinato	NIVEL 1	Probablemente seguro	
Clorpropamide	NIVEL 1	Probablemente seguro	

Fenobarbital	NIVEL 1	Probablemente seguro	
Cimetidina	NIVEL 1	Probablemente seguro	
Furosemida	NIVEL 1	Probablemente seguro	
Doxiciclina	NIVEL 1	Probablemente seguro	
Clopidogrel	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	
Ibersartan	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	
Reserpina	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	
Nadolol	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	

Atenolol	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	
Cloranfenicol	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	
Nimesulida	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	
Sinvastatina Atorvastatina	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	
Prazosina	NIVEL 2	Puede provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia	
Anfetamina	NIVEL 3	Irritabilidad, pobre patrón del sueño.	
Cocaína	NIVEL 3	Irritabilidad, convulsión	
Heroína	NIVEL 3	Temblor, pobre alimentación, vómito	

Fenciclidina	NIVEL 3	Potente alucinógeno	
Litio	NIVEL 3	Cianosis, letargia, cambios EEG.	
Cloranfenicol	NIVEL 3	Depresión de la medula ósea	
Ergotamina	NIVEL 3	Vómito, diarrea, convulsiones	
Metinazole	NIVEL 3	Intervención en la función tiroidea	
Bromocriptina	NIVEL 3	Supresor de la lactancia	
Dapsona	NIVEL 3	Anemia hemolítica	

Marihuana	NIVEL 3	Alteraciones del SNC	
Tabaco	NIVEL 3	Exposición a la nicotina, cotinina, xenobioticos	
Alcohol etílico	NIVEL 3	Disminuye la liberación de la oxiócica, retraso psicomotor; se recomienda esperar 2 horas pos ingesta de bebida alcohólica.	