

# FARMACOLOGIA



**Nombre de la institución:**  
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

**Nombre del alumno:**  
María Del Pilar Castro Pérez

**Carrera:**  
Medicina Humana

**Catedrático:**  
QFB.: Alcázar Hernández Alejandra Gpe.

**Tema:**  
“Tipos de dosis 5 fármacos”

FÁRMACO	PRESENTACIÓN	DOSIS TERAPÉUTICA	DOSIS TOXICA	DOSIS LETAL
<b>Metformina</b>	En tabletas la presentación viene de: 500, 750, 850, 1000 mg.	Usualmente se administra en adultos 500 u 850 mg 2-3 veces al día, durante o después de comidas.	La referencia es de 70.4 mg/L.	La referencia es de 188 mg/L.
<b>Midazolam</b>	En ampollas de 15mg/3ml.	Premediación VO: adultos 0.25-1 mg/kg. Niños 0.25-0.5 mg/kg.	En niños rebasando 20 mg por dosis, provoca un efecto toxico. En adultos rebasando los 15 mg aparece un efecto toxico.	Una dosis letal se produce hasta 120mg/día a más.
<b>Diazepam</b>	Se presenta en comprimidos de 2mg, 2.5mg, 5mg, 10mg y 25 mg. Ampollas 10mg/2ml.	Dosis en adultos 2-10mg 2-4 veces al día.	Requiere de dosis de 500 mg.	Requiere de dosis más de 1 gramo.
<b>Lidocaína</b>	En presentaciones de 20 mg/0.005 mg/1 ml en solución inyectable.	Lidocaína sin epinefrina: 5 mg/kg Lidocaína con epinefrina 7 mg/kg.	8 mg/kg	10 mg/kg
<b>Clonazepam</b>	Se presenta en tabletas de 0.5y 2ml.	Dosis usual de 4-8 mg/día en adultos. En niños hasta los 10 años, 0.2 kg/kg/día.	La referencia es en adultos de 20 mg/día. En niños de 1-3 mg/día.	La referencia es de 30-40 mg/día.