

FARMACOLOGIA

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Nombre del alumno:

María Del Pilar Castro Pérez

Carrera:

Medicina Humana

Catedrático:

QFB.: Alcázar Hernández Alejandra Gpe.

Tema:

“Fármacos que dañan al RN en la lactancia”

NIVEL 0 MUY BAJO: Sustancia con seguridad demostrada para la lactancia y para el lactante con información publicada suficientemente en la literatura científica. Por lo tanto, compatible con la lactancia. Puede tomarse con amplio margen de seguridad.

NIVEL 1 RIESGO BAJO: Producto probablemente seguro. Sustancia que podría provocar efectos adversos muy leves o se han comunicado los mismos o no hay datos publicados, pero las características fco. -qcas. y farmacocinéticas de absorción distribución y eliminación hacen muy poco probable los efectos adversos. Hay que considerar la dosis, horario, tiempo de administración, edad del lactante y así como realizar un seguimiento del mismo.

NIVEL 2 RIESGO ALTO: Sustancia que podría provocar efectos adversos moderados sobre la lactancia o el lactante, se han comunicado los mismos o no hay datos. Hay que valorar riesgo-beneficio y buscar una alternativa segura. En caso de no poder evitarlo considerar, dosis, horario y realizar seguimiento.

NIVEL 3 RIESGO MUY ALTO: Está contraindicado Alta probabilidad de ser tóxica para el lactante o perjudicial para la lactancia por inhibir su formación. Medicamento que por los datos publicados y sus características precisa una alternativa. De no existir y ser estrictamente necesario para la madre obliga a la interrupción de la lactancia.

Fármaco

Clasificación

Dibujo

Amitriptilina

Nivel 0



Metformina

Nivel 0



Levotiroxina

Nivel 0



Prednisona

Nivel 0



Teofilina

Nivel 0



Fármaco

Clasificación

Dibujo

Nifedipina

Nivel 0



Diltiazem

Nivel 0




Acetaminofén

Nivel 0



Lamotrigina

Nivel 1



Aspirina

Nivel 1



Fármaco

Clasificación

Dibujo

Dimenhidrinato

Nivel 1



Clorpropamide

Nivel 1



Fenobarbital

Nivel 1



Cimetidina

Nivel 1



Furosemida

Nivel 1



Fármaco

Clasificación

Dibujo

Doxiciclina

Nivel 1



Clopidogrel

Nivel 2



Irbesartan

Nivel 2



Reserpina

Nivel 2



Nadolol

Nivel 2



Fármaco

Daño

Dibujo

Atenolol

Nivel 2




Cloranfenicol

Nivel 2



Nimesulida

Nivel 2



Sinvastatina
Atorvastatina

Nivel 2



Prazosina

Nivel 2



Fármaco

Dañó

Dibujo

Anfetamina

Irritabilidad, pobre patrón del sueño

Nivel 3



Cocaína

Irritabilidad, convulsion

Nivel 3



Heroína

Temblor, pobre alimentación, vomito

Nivel 3



Fenciclidina

potente alucinogeno

Nivel 3



Litio

cianosis, letargia, cambios EEG

Nivel 3



Fármaco

Daño

Dibujo

Cloranfenicol

depresión de la médula
ósea

Nivel 3



Ergotamina

vomito, diarrea,
convulsión

Nivel 3



Metinazole

interfiere la función
tiroidea

Nivel 3



Bromocriptina

suprime la lactancia

Nivel 3



Dapsona

anemia hemolítica

Nivel 3



Fármaco

Daño

Dibujo

Marihuana

alteraciones del SNC

Nivel 3



Tabaco

exposición a la
nicotina, cotinina, xenobioticos

Nivel 3



Alcohol Etílico

disminuye la liberación de la
oxitocina, retras
psicomotor; se recomienda
esperar 2 horas
postingesta de bebida
alcohólica

Nivel 3

