ULCERAS POR PRESION

PROVOVADA POR UNA PRESION CONTINUA PRODUCE DAÑO DEL TEJIDO CUTANEO SON LESIONES DE LA PIEL

CAUSAS

CAUSADA POR ISQUEMIA DEFICIENCIA DE DEL APORTE SANGUINEO CUANDO LA SANGRE NO PUEDE LLEGAR AL TEJIDO.

FACTORES DE RIESGO

NUTRICION INADECUADA

CONTINENCIA FECAL Y URINARIA

DISMINUCION DEL ESTADO MENTAL

DISMINUCION DE LA SENSIBILIDAD

CALOR EXCESIVO DEL CUERPO

ADAD AVANZADA

INMOVILOIDAD

ENFERMEDADES CRONICAS

CLASIFICACION

ESTADIO1:ERITEMA QUE NO PALOIDECE

ESTADIO2:PERDIDA CUTANEADE GROSOR PARCIAL

ESTADIO3:PERDIDA CUTANEA DE GROSOR COMPLETO NECROSIS

ESTADIO4:PERDIDA TOTAL DE LA PIEL AFECTA EN LOS HUESOS,MUSCULO YTENDONES

CUIDADOS DE ENFERMERIA

MANTENER VIGILANCIA

LIMPIEZA DE LA HERIDA CONSTANTEMENTE

NO UTILIZAR VENDAJES

TRATAMIENTO

LIMPIEZA DE LA HERIDA

DESBRINDAMIENTO DE LA HERIDA

DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA HERIDA

SELECCIONAR APOSITOS PARA MEJORAR EL ESTADO DE LA HERIDA.