

Principales Complicaciones Durante el embarazo

Otras Complicaciones

placenta previa
 Se denomina así cuando la placenta se ubica anatómicamente por delante de la cabeza del bebé tapando el orificio del cuello

Embarazo Múltiple
 Apartir de los ocho semanas es posible diagnosticar ecográficamente un embarazo múltiple es un embarazo con mayor riesgo por que se asocia a parto prematuro

Anemia por deficiencia de hierro
 Las mujeres embarazadas necesitan más hierro de lo normal debido a que durante el embarazo produce mayor cantidad de sangre

Nausea y vomito
 es normal durante el embarazo en especial durante el primer trimestre algunas mujeres experimentan síntomas más graves que pueden durar hasta el tercer trimestre

Principales Complicaciones

Mortinatalidad
 perdida del embarazo despues de la semana 20 del embarazo se denomina mortinatalidad

infección
 algunas infecciones pueden transmitirse de la madre al bebé a través del canal de parto

Diabetes gestacional
 ocurre cuando una mujer que no tiene diabetes antes del embarazo desarrolla la infección durante el embarazo

presión arterial alta
 ocurre cuando se estrechan las arterias que transportan la sangre del corazón a los órganos del cuerpo

preclampsia
 es una afección médica seria que puede ocasionar un parto prematuro y la muerte

perdidas de embarazo
 aborto espontaneo es la pérdida de un embrión por causas naturales antes de las 20 semanas

trabajo de parto prematuro
 es un parto que comienza antes de las 37 semanas de embarazo