



Licenciatura en enfermería



**Presenta:** Alondra Yoana Rodríguez González.

**Docente:** Edgar Giovanni Liévano Montoya.

**Trabajo:** Mapa conceptual (Las principales complicaciones durante el embarazo).

**Materia:** Enfermería en el cuidado de la mujer.

**Cuatrimestre:** 4°

**San Cristóbal de las casas, Chiapas**

**Noviembre 2020**



## Principales complicaciones durante el embarazo

Son los problemas de salud que pueden afectar a la madre, al bebé o ambos, producen durante el embarazo.

### Primer trimestre

#### Aborto:

Es la pérdida del feto del feto por causa natural o espontánea. Puede ser: retenido, incompleto y completo.

Hiperémesis gravídica. Vómitos excesivos en el embarazo causan deshidratación e inanición.

Causas: elevación rápida de los niveles de séricos de HGC secretada por el feto y aumento de estrógenos.

Embarazo ectópico: Es cuando el feto se desarrolla fuera del útero, constituye un riesgo para la vida y debe ser extirpado.

Causas: Obstrucción física o cicatrización por infección previa en la trompa de Falopio, endometriosis, etc.

Anencefalia: defecto de nacimiento (congénito). Los bebés nacen con partes faltantes del encéfalo.

### Segundo trimestre

Preeclampsia: una afección comienza después de las 20 semanas de embarazo que ocasiona hipertensión y problemas en los riñones, también llamada toxemia.

Síntomas: hipertensión, hinchazón de las manos y cara, demasiadas proteínas en la orina, mareo etc.

Placenta previa: ocurre cuando la placenta se sitúa delante de la cabeza del bebé y tapa el orificio del cuello del útero.

Anemia: es una disminución de la concentración de hemoglobina en la sangre.

Diabetes Gestacional. Exceso de los niveles de azúcar en la sangre, aumenta el riesgo de preeclampsia y parto prematuro y por cesárea

Hidrocefalia: incremento anormal del líquido cefalorraquídeo en los espacios ventriculares del cerebro

### Tercer trimestre

Desprendimiento de la placenta: antes de que el bebé nazca, la placenta se puede despegar de la pared del útero esto da una hemorragia en la zona.

Rotura prematura de bolsa: es la pérdida del líquido amniótico por los genitales, esto puede evadir el líquido y provocar una infección al feto

Erupciones cutáneas: los más comunes herpes y urticaria

Infecciones respiratorias virales (contagiosas)

Incompatibilidad de RH entre madre y feto: es la diferencia del grupo Rh entre la sangre de la madre y feto

Polihidramnios: es el exceso de líquido amniótico.  
Oligohidramnios: es la disminución de la cantidad del líquido amniótico.

Retraso del crecimiento intrauterino (RCIU).  
Hidatiforme: Tumor poco común en el interior del útero