

Cuadro comparativo de lesiones por arma de fuego

Materia: Medicina forense

Alumnos: Roberto Gómez Albores

Catedrático: Dr. Leonardo Daniel Nanduca Navarro

5 "A"

DISPARO A BOCA DE JARRO**DISPARO A QUEMA ROPA****DISPARO A CORTA DISTANCIA****DISPARO A LARGA DISTANCIA**

Se produce cuando la boca de fuego del arma está en contacto directo

distancia no mayor a 1 cm

disparos realizados entre 1 y, máximo, 70 cm de distancia

las causan proyectiles disparados a más de 70 cm de la víctima

los elementos se introducen en el trayecto

La llama quema la piel o las ropas de la víctima

a los elementos del disparo comienzan a separarse y no se observan sus marcas en la lesión.

pierden fuerza cinética rápidamente, y se disuelven en el aire

En la ropa se puede encontrar el signo de calcado o signo de Bonnet

puede presentar vesículas secundarias a la quemadura de la flama

se observa desde adentro hasta afuera el halo de Fisch,

Sólo el proyectil alcanza a la víctima

Se pueden encontrar trazos de carboxihemoglobina en la herida

El efecto de la flama también se ve en el cabello o en el vello alrededor de la herida

alrededor de éste se encuentra el tatuaje de pólvora

Se presentarán los signos de contusión mecánica del proyectil sobre la piel

Se encuentra una superposición de tatuaje, de ahumamiento y de la quemadura alrededor del orificio de entrada