

Universidad del Sureste Escuela de Medicina

Cuadro comparativo


“Lesiones por arma de fuego ”

Docente: Dr. Leonardo Daniel Nanduca Navarro

Materia: Medicina Forense

Grado: 5° **Grupo:** ”B”

Alumna: María Fernanda Hernández Jardón



Lesiones por Arma de Fuego



Tipo de lesión	Distancia de disparo	Característica	Característica principal	Característica orificio de entrada	Característica orificio de salida
Disparo a boca de jarro 	3 a 25 cm	Se realiza con la boca del arma en contacto con la piel.	Viene definido por la violencia de las lesiones, estallidos, arrancamientos, cutáneos.	Contacto firme	Estallido, corte cutáneo
Disparo a quema ropa 	0-1 cm, pero a veces hasta los 4 cm.	Realizado a una distancia no superior al alcance de la llama.	Herida a distancia de anillo de fish, tatuaje, quemadura y amumamineto	Rodeado por la cintilla de contusión	Tatuaje denso, ennegrecido, superficie comprueba efectos de quemadura por la llama.
Disparo a corta distancia 	30 a 70 cm	Dispersion del tatuaje, quemadura alrededor del orificio	No se sobrepasa los 60 a 70 centímetro	Modo especial, la anchura del tatuaje y la separación de los elementos	Distancia a que se haya obteniendo del tatuaje
Disparo a larga distancia 	1 metro	Disparos hechos a distancias superiores al alcance de los elementos que constituyen el tatuaje	Caracteriza morfológicamente por este carácter negativo	Herida ovalada o circular	Presenta cintilla erosiva-contusa y cerco de limpieza