

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

5to Semestre

Grupo "B"

MEDICINA FORENSE

20/10/2020

DR. LEONARDO DANIEL NANDUCA

Presenta:

- ROMINA CORONADO ARGUELLO



Lesiones por

Arma de fuego

| | DISPARO A BOCA DE JARRO | DISPARO A QUEMARA ROPA | DISPARO A CORTA DISTANCIA | DISPARO A MEDIANA DISTANCIA | DISPARO A LARGA DISTANCIA |
|--|--|--|---|--|--|
| Distancia de disparo | Distancia aprox. de um 1 cm | Se da de 2 a 12 cm Y de 5 cm para pistolas cuya munición está cargada con pólvora blanca y un poco más si la pólvora es negra | De 2 a 60 cm | De 1 a 70 cm de distancia | Se situa del metro hasta donde alcance la bala |
| Tipo de lesión característica | Es el disparo efectuado con la boca del arma aplicada contra el cuerpo de la víctima, en contacto con la piel de la misma. llama quema la piel o las ropas de la víctima (quemarropa). Signo de la impronta de la boca. La piel puede presentar vesículas secundarias a la quemadura de la flama | Anillo de Fish, tatuaje, quemadura y ahumamiento | La herida es similar que a quemarropa, quitando los efectos que produce la llama | anillos de enjugamiento y de contusión, respectivamente; alrededor de éste se encuentra el tatuaje de pólvora, también conocido como taraceo | La herida es ovalada o circular y presenta la cintilla erosiva-contusiva y cerco de limpieza |
| Características principales | Por efecto de los gases, hay lesiones muy destructivas en los tejidos internos, con disección de los mismos que se encuentran manchados de negro de humo | | Los restos de polvora no suelen pasar de los 70 cm de distancia, alcanzando poco más los de pólvora no quemada | En los orificios creados por disparos de distancia intermedia se observa desde adentro hasta afuera el halo de Fisch. | Los elementos del disparo pierden fuerza cinética rápidamente, y se disuelven en el aire |
| Características del orificio de entrada y salida | El orificio de entrada tiene forma estrellada | En su orificio de entrada presenta una cintilla de contusión, halo de quemadura y un tatuaje denso y ennegrecido | Signo del anillo de humo (Benassi). Presente en el epicraneio alrededor de la perforación de entrada, es útil cuando el tejido blando | Por el anillo de enjugamiento: circunda al orificio y forma un reborde negruzco Por el anillo de contusión: zona rojiza de piel desprovista de epidermis, situada por fuera del anillo de enjugamiento, | Anillo de contusion: cintilla erosiva, es zona rojiza de piel desprovista de epidermis, Anillo de enjugamiento: circunda |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | esta putrefacto. Signo de Boca: de Mina (hofmann) aspecto desgarrado de bordes irregulares y ennegrecidos | producida por la fricción y el calor del proyectil sobre la piel | al orificio y forma un reborde negruzco, debido al polvo y al lubricante |
|--|--|--|--|---|--|