

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia: Inmunoalergias


Tema: Algoritmo Diagnóstico-Terapéutico Urticaria-Angiodema

Presenta: Pedro Méndez Vázquez


Dr. Pérez Aguilar Antonio de Jesús

Lugar y fecha

Universidad del Sureste, 14 de septiembre de 2020.




En urticaria por AINEs el medicamento es mediante la sobreproducción de mediadores químicos (leucotrienos)



Al remitir el cuadro, continuar antihistamínico H1 de 2ª generación no sedante 3-4 sem

Anafilaxia: 1ª opción: adrenalina IM 1:1.000 (>25 kg = 0.3 mL; <25 kg = 0.01 mL/kg/do)

CRÓNICO



Ciclo corto de esteroide oral: prednisona 0.5-1 mg/kg/día (o equivalente) por 5 a 7 días

*Dosis 4 x: Eficacia y seguridad: bilastina, desloratadina, levocetirizina (rupatadina)/seguridad: ebastina, fexofenadina

** Alternativas de eficacia limitada: cloroquina, metotrexato, gammaglobulina IV, tacrolimus, micofenolato, colchicina, dapsona

Referencia bibliográfica

Revista Alergia México. Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, A. C.
Urticaria y Angiodema.