



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA HUMANA

INMUNOALREGIAS

CUADRO COMPARATIVO DE URTICARIA Y

ANGIOEDEMA

DR. PÉREZ AGUILAR ANTONIO DE JESUS

PRESENTA: MARTÍN PÉREZ DURÁN

GRADO: 8

GRUPO: ``A``

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUADRO COMPARATIVO DE URTICARIA Y ANGIOEDEMA

	URTICARIA	ANGIOEDEMA
Clasificación según su duración	<p>Aguda: duración de la enfermedad inferior a 6 semanas.</p> <p>Crónica: presencia de urticaria la mayoría de los días de la semana durante un período igual o superior a 6 semanas.</p>	<p>Aguda: duración desde unos minutos hasta algunas horas.</p> <p>Crónica: aquel en el que la afección persiste o se presenta a lo largo del tiempo y su causa es difícil de identificar.</p>
Definición	Enfermedad que se caracteriza por la presencia de habones pruriginosos, y se presenta en la superficie de la dermis.	Es una tumefacción más profunda de la dermis o del tejido subcutáneo que puede producirse de forma aislada o con habones.
Gravedad	No es mortal	Es potencialmente mortal
Antecedente familiar	Puede ocurrir en cualquier persona	Por lo general puede ser por antecedentes familiares.
Razón	Son causados por la liberación de histamina de la vasculatura dérmica o vasos sanguíneos de la piel.	Las personas con deficiencia de esterasa C1 son propensas a tener angioedema después de la exposición a los alérgenos.
Localización	Se puede presentar en cualquier parte del cuerpo.	Generalmente afecta cara, laringe, faringe o partes de alguna extremidad.
Presenta prurito	Si presenta	No presenta
Afectación de la lesión	Se limitan a la dermis superficial	Comprometen a la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo

Referencia Bibliográfica

Tincopa-Wong (2014). "Urticaria y angioedema: una visión general". Sociedad Peruana de Dermatología. Minsa.Trujillo, Perú. 31(2):111-124.

Nebreda.V. (2006). "Urticaria. Angiodema". Hospital Infantil Universitario de La Paz. Madrid. SEUP-AEP.