



INMUNOALERGIAS.

CUADRO COMPARATIVO DE URTICARIA Y ANGIOEDEMA

DOCENTE: DR. PEREZ AGUILAR ANTONIO DE JESUS.

PRESENTA: XIMENA ALEJANDRA GOMEZ BRIONES

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS, 09 DE SEPTIEMBRE
DEL 2020**

Urticaria	Angioedema
La ocurrencia de múltiples, grandes, ligeramente levantadas, manchas rojas pálidas causadas por reacciones alérgicas.	La rápida inflamación de la dermis, tejido subcutáneo, mucosa y tejido submucoso.
Ocurre en la piel.	Ocurre alrededor de la boca y la vía aérea superior.
No es mortal.	Es potencialmente mortal.
Es potencialmente mortal.	Ocurre debido a la deficiencia de C1 esterasa.
Se trata con antihistamínicos y esteroides.	Necesita intubación endo-traqueal para proteger la vía aérea superior junto con otro tratamiento de apoyo.
Puede ocurrir en cualquier persona.	Por lo general se corre en las familias.
Debe hacerse con el eritema multiforme (lesiones en diana) y más raramente con el prurigo, eccema, psoriasis, dermatitis herpetiforme, penfigoide, eritema anular y toxicodermias.	Puede confundirse con el linfedema, infección (erisipela, celulitis), dermatitis de contacto, edema idiopático del escroto y con el síndrome de Melkersson Rosenthal (hinchazón persistente de los labios, y lengua con parálisis facial).



Bibliografía

SUBIZA, J. (2019). Urticaria y/o Angioedema. *CLINICA SUBIZA* .