


Escuela De Medicina Universidad del Sureste

ALGORITMO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE DERMATITIS ATOPICA

Presenta: Francisco Lara Vega
Dr. Pérez Aguilar Antonio De Jesús
Grado: 8vo Grupo A
Materia: Inmunoalergias
Fecha: 22/11/2020

Algoritmo Diagnóstico
Temperos de
Dermatitis Atópica

Francisco Lara Utop
Dr. Boce Aguilar Martínez
de Jesús
Inmunología Buc. Snc.



Identificar factores de riesgo o exacerbantes

- Jabones y jabonosos
- Infecciones en piel
- Contacto con: Alérgenos ambientales, Alimentos atóxicos, Látex de caucho, Hierba, Cosméticos

Tratamiento

- No farmacológico
- Evitar factores desencadenantes y irritantes.
 - Tratar de hiper sensibilización

- Farmacológico
- DTA leve - Corticosteroides tópicos de acción leve
 - Emolientes
 - DTA Moderada: Inhibidores tópicos de calcio
 - Corticosteroides tópicos de acción moderada
 - Emolientes
 - DTA Grave: Inhibidores tópicos de calcio
 - Corticosteroides tópicos de acción potente
 - Emolientes

Medicamentos utilizados

- Lorazepam 7-14 días tab.
- Clorfeniramina Sol. oral, 7-14 días
- Hidrocortisona 7-10 días crema
- Fluocinonida 7-10 días crema

Algoritmo Diagnóstico Terapéutico de Dermatitis Atópica

Francisco Lara Vega
Dr. Pérez Aguilar Antonio
de Jesús
Inmunología Suo Snc.

Paciente que ingresa al
área de urgencias
con padecimiento actual
de:

- Prurito intenso
- Piel seca
- Eritema
- Erudado

¿Pasos a realizar?

Historia Clínica
y
Exploración física

- Factores de riesgo
 - ↳ Alteraciones de piel
 - Irritantes: Jabones, Champú, Detergentes, Jabón líquido
 - Alimentos y abisacas
 - Exposición a alérgenos

- Antecedentes de DA familiares
- DA previa
- Áreas del cuerpo afectadas

Pruebas complementarias

- Tomar como criterio mayor la presencia de Prurito
- Observación clínica
- Pruebas cutáneas

Diagnóstico diferencial con

- Escarlatina
- Quemadura química
- Alergia alimentaria

Clasificación
DA

- Ligera → Piel normal sin antecedentes de DA activa
- Leve → Piel seca, Prurito intermitente
- Moderada → Piel seca, Prurito frecuente
- Grave → Áreas extensas de Piel seca, Prurito intenso

Identificar factores de

Tratamiento

Grave → Área extensa de piel seca, Prurito intenso

Identificar factores de
recurrencia o exacerbación

- Jabones y detergentes
- Infecciones en piel
- Contacto con: Alergenos inhalados
Alimentos alergicos
Lodo de agua
Huevo
Cacahuates

Tratamiento

No farmacológico

- Identificar factores desencadenantes
y evitarlos.
- Terapia de línea sensitización

Farmacológico

- DIT leve = Corticoides tópicos de acción
leve
- Emolientes
- DIT Moderado = Inhibidores tópicos de calcio
Corticosteroides tópicos de
acción moderada
Emolientes
- DIT Grave = Inhibidores tópicos de calcio
Corticoides tópicos de acción
potente
Emolientes

Medicamentos
indicados

- Lorastadina
7-14 días tab.
- Clorfeniramina
Sol. oral, 7-14 días
- Hidrocortisona
7-10 días crema
- Fluocinolona
7-10 días, crema