

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Cuadro comparativo de Urticaria y Angioedema

INMUNOALERGIAS

8° "A"

- **Docente: Dr. Antonio de Jesús Pérez Aguilar**
- **Alumno: Víctor Manuel Jiménez Valdivieso**

14 de Septiembre de 2020

Comitán de Domínguez, Chiapas

	Definicion	Etiología	Histología	Clínica	Laboratoriales	Tratamiento
Urticaria	Erupción cutánea caracterizada por ronchas ya sean pápulas o placas denominadas habones	Alergia a alimentos Infecciones Estímulos físicos Calor Frio	Vasodilatación de pequeñas vénulas y capilares en la dermis superficial con edema papilar	Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, con frecuencia en lugares donde existe presión o expuesta a la intemperie, presencia de hongos que causa prurito por la liberación de histamina	BHc, VSG, PCR	Evitar el agente causal, antihistamínicos, corticoesteroides sistémicos, antileucotrienos, inhibidores de la calcineurina (ciclosporina, tacrolimus), otros medicamentos inmunosupresores sistémicos (micofenolato, hidroxicloroquina, dapsona, sulfasalazina, metotrexato, colchicina) y omalizumab y otros biológicos.
Angiodema	Es un edema de la dermis profunda y de los tejidos subcutáneos	Hereditario Adquirido Inducido por drogas idiopático	Alteraciones similares a nivel de dermis profunda y tejido subcutáneo	Afecta preferentemente lengua, cara miembros superiores e inferiores, no tiene contornos nítidos, elástico, indoloro, no pruriginoso sin fobia a la presión.	EGO, QS, perfil de lípidos, PFHs, Hepatitis B,C.	Esteroides Antihistamínicos

Bibliografía

Essentials, M. A. (2017). *Alergología Escencial*. España: Elsevier.