

# Escuela De Medicina Universidad del Sureste

---

## LESIONES DERMATOLÓGICAS

---

**Presenta: Francisco Lara Vega**  
**Dr. Pérez Aguilar Antonio De Jesús**  
**Grado: 8vo Grupo A**  
**Materia: Inmunoalergias**  
**Fecha: 18/10/2020**

# Morfología de lesiones Dermatológicas

Las lesiones dermatológicas son una zona de la piel que es distinta a la piel que la rodea. Puede tratarse de una protuberancia, una llaga o una zona de piel que no es normal.

Por lo regular este tipo de lesiones aparecen sin lesiones previas.

Las lesiones dermatológicas se clasifican en Primarias y Secundarias.

- Primarias = Lesiones que aparecen de novo sin lesiones previas.

• Macula = Área plana de la piel de color diferente a la piel normal, esta suele describirse como un adjetivo que califica el color de la piel "Purpúrica, eritematosa, esmetada"

- Pápula = Lesión circunscrita, elevada y sólida de tamaño inferior a 1 cm.

• Nódulo = Lesión elevada, sólida de tamaño mayor a 1 cm

• Tumor = Lesión sólida, sobrelevada de mayor tamaño con tendencia a persistir

• Vesícula = Lesión elevada llena de líquido de menos de 1 cm.

• Ampolla = Lesión elevada, llena de líquido de más de 1 cm.

• Pústula = Lesión elevada, llena de pus de menos de 1 cm.

• Herpes = Elevación circunscrita de la piel, de forma y dimensiones variables, estériles y de evolución fugaz con pocas horas de duración.

• Placas = Lesiones palpables, suelen medir más de 10 mm de diámetro y se encuentran elevadas o deprimidas en comparación de la piel.

• Escamas = Acumulaciones del epitelio cornificado.

• Costras = Formadas por suero, sangre o pus secos.

• Erosiones = Áreas abiertas de la piel como resultado de la pérdida de parte o toda la cubierta.

× Lesiones secundarias = Este tipo de lesiones aparecen a partir de alguna alteración patológica de la piel.

- Costras = Formadas por suero, sangre o pus secos,

- Escamas = lesiones secas, derivadas del estado corneo

- **Excoriaciones:** erosión producida por el rascado suele ser lineal e indican un proceso prurítico
- **Fisura:** Grietas cutáneas que aparecen sobre la piel seca y en afectaciones cutáneas crónicas.
- **Cicatrices:** Marcas permanentes derivadas de un daño dérmico, pueden ser atróficas, hipertroficas o queloides.
- **Atrófica:** Pérdida del espesor y consistencias normales de la piel.
- **Esclerótica:** Áreas de endurecimiento de la piel, debidas a daño dérmico.
- **Infiltración:** Aumento del espesor de la piel, con participación de la dermis y en ocasiones de tejidos más profundos. Producido por inflamación o por neoformaciones tumorales.
- **Goma:** Nódulo que se reblandece y ulcera, endureciendo por etapas de crujeza, reblandecimiento, ulceración y reparación.

## Bibliografía

Dr. Víctor Alegre de Miquel. (s.f.). *Aproximación al diagnóstico dermatológico*. Obtenido de <https://www.uv.es/derma/CLindex/CLsemiologia/CLsemiologia.html>

Julia Benedetti . (Febrero de 2019). *Descripción de las lesiones cutáneas*. Obtenido de MANUAL MSD Version Para Profesionales:  
<https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-dermatol%C3%B3gicos/abordaje-del-paciente-dermatol%C3%B3gico/descripci%C3%B3n-de-las-lesiones-cut%C3%A1neas>