

Universidad del Sureste

Materia: Inmunoalergias

Docente: Dr. Antonio de Jesús Pérez Aguilar

Cuadro comparativo de Urticaria y Angioedema

Alumno: José Alfredo Sánchez Álvarez

8° Semestre Grupo “Único”

Comitán de Domínguez

14/09/2020

Cambios histológicos

Topografía más frecuente

Prurito

Distribución

Manifiesta

A la presión

Duración

Urticaria

Edema de capas superficiales e intermedias de la dermis con dilatación de vénulas poscapilares y vasos linfáticos de dermis superficial

En cualquier lugar del cuerpo

Con prurito

Más o menos simétrica

Ronchas de 2 mm-10 cm o más (habones)

Desaparecen

Minutos a horas y desaparecen sin dejar huella

Angioedema

Edema de capas profundas de dermis y tejido subcutáneo, con dilatación de vénulas poscapilares y vasos linfáticos de dermis profunda

La cara (los párpados y los labios), las manos, los pies, el escroto y las mucosas (oral, genital)

Poco pruriginoso, más doloroso

Asimétrica

Edema desde cm hasta afectar un miembro

No deja fóvea

Fugaz pero frecuente recidiva local

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

D, L.-L. (2014). Guía mexicana para el diagnóstico y el tratamiento de la urticaria. *Revista Alergia México*, 1-77.