

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Inmunoalergias

Catedrático: Dr. Antonio de Jesús Pérez Aguilar

Alumno: Mariana C. Saucedo Domínguez

8to Semestre Grupo A

Comitán de Domínguez Chiapas, Octubre del 2020

Lesiones Dermatológicas Primarias

Las lesiones primarias son aquellas que se asientan sobre una piel previamente sana, a su vez, estas se subclasifican.

Lesiones primarias de contenido sólido:

- **Mácula:** Cambio de coloración de la piel, por alteración de la pigmentación, de la vascularización o por depósitos de pigmentos ajenos de la piel (tatujes, ictericia). (≤ 1 cm).
- **Placa:** Lesión elevada de consistencia sólida, cuya altura es menor comparada con su extensión (mm de altura y varios cm de área).
- **Paipula:** Levantamiento sólido que mide menos de 0.5 cm, con involución espontánea sin dejar huella, su origen puede ser endérmico o dérmico.
- **Nódulo o goma:** Levantamiento duro, sólido, firme, bien delimitado, mayor de 1 cm de diámetro evolución crónica, que al desaparecer deja huella. Suele localizarse en la dermis o hipodermis.
- **Nudosidad:** Lesión profunda, se palpa más que vece, es dolorosa, al desaparecer no deja huella.
- **Tumor:** Semejante al nódulo, pero de mayor tamaño, alcanzando varios centímetros de diámetro. Puede incluir cualquier capa de la piel y distorsiona las estructuras adyacentes.
- **Rancho:** Lesión sólida, elevada, eritematosa, presenta palidez en su porción central, superficial, mal definido, de tamaño variable, dura horas y desaparece sin dejar huella.

Lesiones primarias de contenido líquido

- **Vesícula:** Lesión de contenido líquido que mide \leq de 0,5 cm. Puede contener líquido seroso o hemático. se encuentra a nivel subcorneo, intrapidérmico o subepidérmico o dérmico.
- **Ampolla:** Lesión de contenido líquido que mide > 1 cm. sublocalización es igual a la de la vesícula.

- Pústula: Son colecciones purulentas, pequeñas y Superficiales, que no dejan cicatriz al romperse. Casi siempre se colecta bajo la Capa Cornea o alrededor del folículo piloso.
- Quiste: Lesiones de Contenido Semi-líquido o líquido producido por la pared epitelial que los rodea. Se presentan como lesiones esféricas de consistencias císticas y bien delimitadas.

Lesiones elementales Secundarias

Son aquellas que aparecen como consecuencia de una lesión primaria o sobre esta:

- Costra: Se produce por la desecación de una sustancia ya sea el Suero, Sangre, exudado o restos celulares. Pueden ser finas y friables o gruesas adheridas a la Superficie.
- Úlcera: Se trata de un defecto de la piel, que resulta de una solución de continuidad que puede comprometerse la epidermis, dermis o tejido subcutáneo.
- Atrofia: Disminución de alguna o todas las Capas de la piel
- Escara: tejido necrótico que el cuerpo intenta eliminar.
- Escama: Proceso final de la aceleración en la queratinización.

Bibliografía

- Sánchez, I.; Quesado, A & Cedeño, L. (2010). "Lesiones elementales en dermatología". Ecu médico; Costa Rica.