

MEDICINA HUMANA

INMUNOALERGIAS

Dr.: Pérez Aguilar Antonio De Jesús

TEMA:

CUADRO COMPARATIVO; ANGIOEDEMA, URTICARIA



PRESENTAN:

LÓPEZ HERNANDEZ SANDIBEL

Octavo semestre grupo único.

CARACTERISTICAS	URTICARIA	ANGIOEDEMA
DEFINICION	Urticaria es una enfermedad con lesiones en la piel calificadas como ronchas, habones (ronchas grandes), angioedema o los tres,	Cualquier tipo no deseada de reacción provocada por la ingesta de alimentos mediada por mecanismo inmunológico
MEDIADORES.	Mastocito, histamina, triptasa	IgE, linfocito T, mastocito
DURACION	1- 24 HORAS	Mas de 24 horas
MANIFESTACIONES CLINICAS	Ronchas con halo eritematoso, y centro pálido, acompañado de sensación ardorosa o quemante	Hinchazón de zonas más extensas de tejido subcutáneo, que a veces afecta a la cara y a la garganta. nauseas, vomito, dolor abdominal
CAMBIOS HISTOLOGICOS	Edema de las capas superficiales e intermedias de la dermis con dilatación de las vénulas poscapilares y de los vasos linfáticos de la dermis superficial	Edema de las capas profundas de la dermis y del tejido subcutáneo, con dilatación de vénulas poscapilares y de los vasos linfáticos de la dermis profunda
CLASIFICACION	Urticaria aguda: as ronchas, comezón y angioedema se prolongan durante más de 6 semanas. Urticaria crónica: as ronchas, comezón y angioedema se prolongan durante más de 6 semanas.	angioedema agudo se desarrolla repentinamente después de la exposición a un factor desencadenante. El angioedema crónico que se presenta sin urticaria puede ser un angioedema hereditario o adquirido
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL	Síndrome de sjogren, dermatomiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo,artritis reumatoide juvenil,granulomatosis, de wegener, poliarteritis nodosa,	Reflujo gastroesofágico, enfermedad inflamatoria intestinal, mala absorción, infecciones,
PRUEBAS DIAGNOSTICAS	Perfi tirideo,anticuerpos antitiroglobulina,antoperoxidasa,biometria hemática completa, reactastes de fase aguda,	Pruebas cutáneas mediadas por IgE, pruebas invitro de IgE alérgeno.especifico

anticuerpos antinucleares, exanem de orina y
biopsia,

Eliminar el alimento específico de la
dieta, esteroides tópicos,

TRATAMIENTO

Antihistamínicos
Corticoesteroides sistémicos
Antileucotrienos
Inhibidores de la calcineurina
(ciclosporina, tacrolimus)
Otros medicamentos inmunosupresores
sistémicos: micofenolato, hidroxiclороquina,
dapsona, sulfasalazina, MTX, colchicina
Omalizumab

BIBLIOGRAFIA.

- 2- Diagnóstico y tratamiento de la alergia alimentaria en niños.,
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/495_GP_C_Alergia_alimentaria_en_ninos/IMSS-495-11-GRR_AlergiaAlimentos.pdf.
- 3- Diagnóstico y tratamiento de urticaria crónica en adultos en los tres niveles de atención.
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/issste_661_13_urticariacronica/grr_urticaria.pdf.
- 4- Guía mexicana para el diagnóstico y el tratamiento de la urticaria,
<http://www.revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/49/66>.