Nombre del alumno:

Vilga Martina Pérez Salas.

Nombre del profesor:

Lic. Ervin Silvestre Castillo.

Licenciatura:

Enfermería

Materia:

Práctica clínica de enfermería II

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual del tema

"Quemadura y accidente ofídico"

Frontera Comalapa, Chiapas a 18 de octubre2020.

Quemadura

- Lesión producidas en los tejidos vivos, debido a la acción de diversos agentes.
  - Físicos: Llamas, liquidos, objetos calintes, rafiacion.
  - Químicos
  - Biológicos
  - Causaticos
  - Clasificación
    - Grado
      - I
      - II-A
      - II-B
      - III
      - IV
    - Espesor
      - Superficial
      - Parcial superficial
      - Parcial profunda
      - Profunda
      - total
    - Presentación clínica
      - seca ,muy dolorosa.
      - Palidez eritematosa.
      - Rompen fácilmente
      - No palidece poco dolor.
- Jackson postulo las zonas concéntricas de quemadura son:
  - Zona de coagulación
  - Zona isquémica o estasis
  - Zona de hiperemia
  - Desde un simple eritema transitorio asta la destrucción total de las estructuras
- Determinación de la de la extensión de quemadura, los métodos son:
  - *Regla de la palma
  - *Regla de los 9
  - *Lund Bowder
- Objetivos:
  - Atención adecuada, aliviar, síntomas, revenir complicaciones prevención de tétanos
  - Formula de hidratación:3-4mlxkgx%superficie corporal quemada ajustado según el blance hídrico
- Riesgo de complicaciones potenciales
  - Infección, desnutrición, obstrucción urinaria por edema, cicatrices patologics, contracturas articulares
- Valoración de quemaduras
  - Extensión, profundidad, localización, edad y sexo, peso y estado nutricional del paciente, estado de conciencia, lesiones tiempo de evolución.
- Métodos de evaluación
  - *Superficie de palma: equivale aproximadamente al 1% de la superficie corporal total.
  - *Regla de loa 9 Wallace: cuerpo se divide en aéreas equivalentes 9% e utiliza para estimar la extensión de quemaduras en adultos.
  - *Plantilla lund bowder: compensa las variaciones de forma de cuerpo en distintas edades y más en niños.

Accidente ofídico

- Ofídico
  - Lesión de mordedura de serpiente
  - Ofídico venoso
    - Viperidos vivoras;yarará y cascabel elapdpidos ;coral
  - Ofídico no venosas
    - Colúbridos:culebra
    - booidios:boa
- Clasificación de los ofidios según la forma y posición de dientes
  - 1. Aglifas
    - 1.no tiene colmillo solo diente.
  - 2-Opistoglifas
    - 2. colmillos pequeños parte posterior maxilar superior
  - 3. Proteroglifas
    - 3.colmillo pequeño fijos en la parte anterior del maxilar.
  - 4. Solenoglifas
    - 4. colmillos medianos y pagables hacia atrás en la parte anterior del maxilar superior
- Acciones fisiopatologicos de los venenos aplicable en nuestro país. (Rosenfeld)
  - 1.Proteoliticas
  - 2.Coagulante
  - 3.Neurotoxica
  - 4.Hemolitica
- Signos y síntomas
  - -Locales
    - Dolor, edema, equimosis, sangrado, necrosis local,filictenas.
  - -Sistémico
    - Nauseas, vomito, taquicardia, dolor abdominal torácico, somnolencia.
- Clasificación signos y síntomas
  - *Ausencias de envenenamiento.
  - *Leve
  - *Moderado
  - *Severo
- Acción del veneno
  - -Inflamatoria aguda
  - -Coagulante
  - -Vasculotoxica
- Tratamiento
  - 1. Medidas generales
    - Retirar lo que pueda comprometer la circulación sanguínea realizar asepsia del área, evitar la administración de inyecciones innecesarias.
  - 2. Acciones que deben evitarse.
    - Usar torniquetes, realizar incisiones, inyectar antiveneno, no succión, no aplicar hielo, no ingeriro alcohol.
- Criterios de Christopher y Rodning (niño y adulto
  - Nos sirve para conocer el grado, los signos y síntomas de la dosis inicial de antiveneno.
- Actualización de enfermería hospitalaria
  - -Continuar con los cuidados hospitalarios
  - -realizar analítica completa
  - -mantener al paciente con reposo absoluto
  - -prevenir el shock anafiláctico