


**NOMBRE DE ALUMNO: HANNIA MAHOMI VELÁZQUEZ CASTILLO**

**NOMBRE DEL PROFESOR: BAYRON IRAM VIDALS CAMPOSECO**



**NOMBRE DEL TRABAJO: ENSAYO**

**MATERIA: PSICOPATOLOGIA 2**

**GRADO: 7**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**GRUPO: "A" "PSICOLOGÍA"**

FRONTERA COMALAPA CHIAPAS A 17/10/2020

## Trastornos

Hoy en día es muy común escuchar la palabra trastorno por qué hay de muchos tipos ya sea de bipolaridad , esquizofrenia , neurocognitivos e incluso alimenticios afectando a las personas de diferentes maneras y por ello es importante reconocer como afecta cada uno de ellos y cuáles son sus características peculiares y cuál es el mejor tratamiento empezaré explicando el trastorno neurocognitivo este trastorno según el DSM-IV se compone por el delirium , demencia , trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos este trastorno comienza con el delirium seguido de síndromes del TNC mayor ,el TNC leve y sus subtipos etiológicos .

Los subtipos de TNC mayor y leve se compone por la enfermedad de Alzheimer , los TCN son únicos en la categoría del DSM ya que la patología subyacente y a menudo también de la etiología , ya que las enfermedades subyacentes con objeto de investigación y experiencia clínica .

La demencia es parte de del trastorno neurocognitivo mayor , , se utiliza en aquellos ámbitos en que los médicos y pacientes estén acostumbrados a este término , afectando las personas mayores . Según (Sepulveda, 2001) “ la demencia es un síndrome, un conjunto de manifestaciones que traducen una falla cónica en el funcionamiento cerebral que puede deberse a múltiples enfermedades “.

El delirium es parte del trastorno neurocognitivo y este se es una alteración de la atención un ejemplo ello es la capacidad de dirigir , este tipo de alteración aparece en poco tiempo ( habitualmente por horas o por pocos días) este constituye a u n cambio de la atención y conciencia y su gravedad es lo largo del día, se obtiene mediante datos indicando la alteración y es parte de una consecuencia fisiológica directa de una afectación médica , una intoxicación o abstinencia por algún tipo de sustancia .

Existen diferentes tipos de delirium como son por intoxicación por sustancias, por abstinencia de sustancias , por afección médica o por etiologías múltiples ,cada uno teniendo diferentes síntomas afectando a las cognoscitivas o trastornos de atención .

Dentro de los trastornos neurocognitivo hay dos tipos el mayor y los leves

El trastorno neurocognitivo mayor es u deterioro sustancial del rendimiento cognitivo , quien diagnostica por un test neuropsicológico estandarizado o por una evaluación clínica cuantitativa , estos déficits interfieren con la autonomía del individuo en sus actividades cotidianas , estos déficits pueden ser causado por la enfermedad de Alzheimer degeneración del lóbulo frontotemporal , traumatismo cerebral , infección dl VIH o también enfermedad por priones.

En cambio el trastorno neurocognitivo leve es un deterioro moderado del rendimiento cognitivo y es diagnosticado por test neuropsicológicos estandarizado o por evaluación clínica cuantitativa estos interfieren con la capacidad de independencia en actividades un ejemplo de ello son pagar facturas o seguir alguna receta de un médico estos déficits pueden ser causa de la enfermedad por cuerpo Lewy , enfermedad vascular o consumo de alguna sustancia o medicamento .

Dentro de los trastornos neurocognitivo de encuentra el trastorno de depresión mayor , y este tipo de trastorno necesita patrones específicos de déficits cognitivos que ayudan a descartarlo un ejemplo del déficits que se puede usar es el déficits sistemático de la memoria y funciones ejecutivas que son típicas de Alzheimer o también se puede observar el patrón de rendimiento intensifico o variable , por ello para tratar este tipo de trastorno es necesario tener por repentinas ocasiones observaciones para tener un buen diagnóstico y este sea un éxito .

Según (Caballo, 2007) el déficit “comprende la habilidad o destreza para resolver conflictos y los problemas cotidianos de manera inmediata, minimizando la probabilidad de futuros problemas”

Par detectar la enfermedad de alzhéimer es por evidencia de mutación genética causante de la enfermedad de alzhéimer mediante una prueba genética o de antecedentes familiares , una forma de explicar esta esta enfermedad que es cerebrovascular o enfermedad neurode-generativa , que son acusa de efectos de sustancia o trastorno mental neurológico o sistemático.

Existen demasiados trastornos dentro de los trastornos neurocognitivos muchos de ellos cumplen con los criterios de un trastorno neurocognitivo mayor a leve, todos estos trastornos se pueden llevar en un proceso de terapia cognitiva viendo cada rasgo y cuál es el inicio de estos trastornos y luego de ello ver cuál es el mejor tratamiento que puede aplicar ya que muchos de estos trastornos empiezan en la edad de la niñez y al pasar los años se van reforzando volviendo más fuertes y pueden ser diagnosticados como mayor o leves .

Otro tipo de trastornos que afecta a muchas personas son los trastornos de la conducta alimentaria e ingesta de alimentos estos son caracterizados por una alteración en la alimentación o comportamiento que se relaciona con la alimentación que puede llevar una alteración en el consumo de alimentos y causa deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial .

Dentro de estos trastornos podemos encontrar la anorexia nerviosa , bulimia nerviosa y el trastorno de atracones de la ingesta de alimentos que conforman un esquema de clasificación en se encuentran varios aspectos con es el pica que es un indigestión persistente de sustancias no nutritiva y no alimentarias de periodo de un mes , y es suficientemente grave y necesita atención clínica muchas de las cosas que las personas consumen dependen de la edad y un ejemplo de alimentos pueden comer los pacientes con este síntoma son jabón , pelo , talco o tierra , y si este comportamiento se produce en un contexto de trastorno mental se debe realizar un diagnóstico diferencial de pica y si el tipo de comportamiento alimentario es grave o si requiere atención clínica .

Otro trastorno que pertenece a este grupo es el de rumiación y este tipo de trastorno se produce en el curso de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa provocando la regurgitación repetida de alimentos después de comer durante periodos ya sean de un mes o más tiempo dependiendo de la gravedad del problema. El otro tipo de trastorno es de evitación este se basa en la falta de interés por comer alimentos o por la preocupación acerca de la acción de comer. A base de los trastornos anteriores se encuentra la anorexia nerviosa que es un problema que hoy en día afecta mucho ya que muchas lo padecen

haciendo que pierdan demasiado peso y que les afecte de manera física y de manera psicológica hasta el punto que por tan bajo peso puedan perder la vida . Otro problema que afecta hoy en día es la bulimia nerviosa que es la ingestión de alimentos de manera excesiva de lo que habitualmente muchas personas ingieren haciendo que luego provocando el vómito o también pueden usar laxantes diuréticos o ejercicio excesivo porque estas personas tienen el pensamiento que se ven gordas cuando en realidad no es así afectándoles de manera psicológica y bajando su autoestima y no dándose el valor que cada persona tiene.

Muchas veces todos trastornos pueden pesar de desapercibido por ello es importante tener un cuenta cuales son las características y las diferencias que cada trastorno tiene ya sea neurocognitiva o alimenticio hay observar y dar un buen tratamiento utilizando las teorías ya sea en el caso del trastorno cognitivo usar la teoría cognitiva que se basa desde la niñez hasta la edad adulta y los trastornos alimenticios se puede usar la teoría cognitivo – conducta para ayudar a que la persona haga conciencia de lo importante que es nuestro cuerpo y el valor que le debemos dar y lo muy importante que somos y que no nos debe afectar lo que otras personas digan de nuestro aspectos ya que todos tienen un valor y todos somos importantes .

## Bibliografía

- Caballo, V. E. (2007). *manual de evaluacion y entrenamiento de las habilidaes sociales*. argentina: siglo XXI de españa ditores .
- Sepulveda, A. D. (2001). *la enfermead de alzheimer y otras demencias* . santiago chile: coleccion manuales y monografis .