

Universidad del Sureste.

Lic. En psicología

7° Cuatrimestre

Psicopatología II

Título: “Cuadro comparativo Trastornos bipolares y depresión”.

Catedrático:

Lourdes Yazmin Sarabia Gonzáles.

Alumno: Mauricio Tovilla de los Santos

23 de Septiembre del 2020

San Cristóbal de Las Casas Chiapas, México.



Tx Bipolares.

Se debe a factores fisiológicos y por ende no hay una cura en si.

Consta de dos fases la maníaca y la depresiva.

En la fase maníaca las personas presentan intolerancia e irritabilidad, sentimientos de grandeza y poca o nula capacidad para conciliar el sueño; esta dura máximo 1 semana.

En esta fase el paciente presenta síntomas similares a la depresión, existe ideación suicida pero el riesgo de suicidio es bajo.

Existen tres tipos de bipolaridad, en el tipo 1 es predominante la manía, mayores probabilidades de brotes psicóticos.

En el tipo dos la fase depresiva es la dominante y recurrente en este tipo las mujeres son más propensas a sufrirlas. Finalmente el tipo mixto presenta ambas fases.

Tx Depresivos.

Cubre una variedad de cambios en los estados de ánimo negativo, en la conducta, puede ser temporal o duradero; puede abarcar sentimientos de melancolía hasta una visión totalmente pesimista del mundo.

La depresión mayor se caracteriza por episodios determinados de al menos dos semanas de duración o más, que implican cambios claros en el afecto, la cognición y las funciones.

El trastorno depresivo persistente o distimia es en cambio la presencia de un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, presente más días de los que está ausente durante un mínimo de dos años.

El trastorno disfórico premenstrual se presenta cuando antes de su período la mujer presenta síntomas de depresión graves, irritabilidad y tensión significativamente más intensos que en el síndrome premenstrual.

El trastorno inducido por sustancias o medicamentos se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, disminución de interés por actividades que antes eran gratificantes, estos iniciados por estimulantes, agentes dermatológicos o fármacos quimioterapéuticos.

