



**Nombre del alumno: Jessica Guadalupe Valdivia  
Herrera**

**Nombre del maestro: Liliana Villegas**

**Materia: psicopatología II**



**Grado :7 cuatrimestre**

**Grupo: único**



# Unidad I

Trastorno	Que es	Síntomas
<b>La depresión</b>	es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza</li><li>• Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso</li><li>• Ansiedad, agitación o inquietud</li><li>• Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales</li><li>• Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches</li></ul>
<b>Distimia</b>	Trastorno depresivo persistente, también llamado distimia, una forma de depresión continua y a largo plazo (crónica) Es posible que pierdas interés en las actividades normales de la vida cotidiana, que te sientas desesperanzado, que te vuelvas improductivo y que tengas baja autoestima y una sensación general de ineptitud. Estos sentimientos duran años y pueden afectar en gran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Falta de interés en las actividades diarias</li><li>• Tristeza, sensación de vacío, depresión</li><li>• Desesperanza</li><li>• Cansancio y falta de energía</li><li>• Baja autoestima, autocrítica o sentirse incapaz o inútil</li><li>• Dificultades para concentrarse y tomar decisiones</li></ul>

	<p>medida tus relaciones y tu desempeño en la escuela, en el trabajo y en las actividades diarias</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irritabilidad o enojo excesivo</li> <li>• Disminución de la actividad, eficacia y productividad</li> <li>• Evitar las actividades sociales, aislamiento</li> <li>• Sentimientos de culpa y preocupaciones por el pasado</li> <li>• Falta de apetito o comer demasiado</li> <li>• Problemas para dormir</li> </ul>
<p><b>Trastorno bipolar</b></p>	<p>El trastorno bipolar, antes denominado «depresión maníaca», es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión) Los episodios de cambios en el estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque la mayoría de las personas presentan síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunas no presenten ninguno</p>	<p>Los episodios maníacos pueden incluir síntomas como exceso de energía, reducción de la necesidad de dormir y pérdida de noción de la realidad. Los episodios depresivos pueden incluir síntomas como falta de energía, poca motivación y pérdida de interés en las actividades cotidianas. Los episodios de cambios de humor duran de días a meses y también pueden estar asociados con pensamientos suicidas</p>

<p><b>Trastorno bipolar II</b></p>	<p>La gravedad del TB-2 puede variar de leve a grave. En los casos graves, el TB-2 puede causar una incapacidad para trabajar o asistir a la escuela, especialmente durante los episodios depresivos, y puede causar problemas graves en las relaciones interpersonales. Muchas personas con TB-2 también tienen otras afecciones psiquiátricas, más comúnmente trastornos de personalidad, el abuso o la dependencia de sustancias y trastornos de ansiedad.</p>	<p>Estado de ánimo: altibajos emocionales, pérdida de interés o placer en hacer actividades, ansiedad, culpa, descontento general, desesperanza, euforia o tristeza profunda Comportamiento: agitación, automutilación, comportamiento compulsivo, impulsividad o irritabilidad Cognitivos: lentitud para realizar actividades, falta de concentración, pensamientos acelerados o pensamientos de suicidio</p>
<p><b>Ciclotimia</b></p>	<p>Es un trastorno mental. Es una forma leve del trastorno bipolar (enfermedad maniaco-depresiva), en la cual una persona tiene oscilaciones del estado de ánimo durante un período de años que van desde depresión leve hasta euforia emocional. Los cambios en el estado de ánimo en las personas con ciclotimia no son tan extremos como en las personas con trastornos bipolares. Las personas con ciclotimia pueden continuar de manera normal con su vida, aunque puede resultar difícil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentirse triste, desesperanzado o vacío.</li> <li>• Ganas de llorar.</li> <li>• Irritabilidad, especialmente en niños y adolescentes.</li> <li>• Pérdida de interés en actividades que alguna vez se consideraron placenteras.</li> <li>• Cambios en el peso.</li> <li>• Sentimientos de inutilidad o culpa</li> </ul>

ESQUIZOFRENIA	Que es	Síntomas
<p><b>Paranoide</b></p>	<p>El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada y sospecha de los demás que implica la interpretación de sus motivos como maliciosos. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. El tratamiento se realiza con terapia cognitivo-conductual. Los pacientes con trastorno de personalidad paranoide desconfían de los demás y asumen que los demás tienen la intención de perjudicarlos o engañarlos, incluso cuando tienen una justificación escasa o nula para estos sentimientos.</p>	<p>A menudo, estos pacientes piensan que otros los han herido en gran medida y de forma irreversible. Son hipervigilantes de posibles insultos, desprecios, amenazas y deslealtades y buscan significados ocultos en las observaciones y acciones. Vigilan de cerca a otros para obtener pruebas para apoyar sus sospechas. Por ejemplo, se puede malinterpretar una oferta de ayuda como una implicación de que no son capaces de hacer la tarea por su cuenta. Si piensan que han sido insultados o lesionados de alguna manera, no perdonan a la persona que los hirió. Tienden a contraatacar o a enojarse en respuesta a estas lesiones percibidas. Porque no confían en los demás, sienten la necesidad de ser autónomos y de controlar la situación</p>
<p><b>Desorganizada</b></p>	<p>La esquizofrenia desorganizada, también conocida como hebefrénica es un trastorno mental en la que el comportamiento del individuo sufre alteraciones espontáneas sin ningún propósito o motivación, agitación y desinhibición. En la esquizofrenia desorganizada es común que se presenten delirios (creencias falsas y fijas) y alucinaciones (percepciones sensoriales sin causa) y las respuestas emocionales son a veces extrañas e inapropiadas para la situación. Asimismo, se</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comportamiento activo pero no constructivo y sin objetivos</li> <li>▪ Respuestas emocionales extrañas e inapropiadas</li> <li>▪ Dificultad para sentir placer (anhedonia)</li> <li>▪ Delirios (creencias falsas y fijas)</li> <li>▪ Falta de motivación</li> <li>▪ Ver y escuchar cosas que no existen (alucinaciones)</li> <li>▪ Comportamiento tonto o extraño</li> <li>▪ Discurso sin sentido</li> </ul>

	<p>observa una completa falta de emoción y de motivación, al igual que incapacidad para sentir placer.</p>	
<p><b>Esquizofrenia catatónica</b></p>	<p>La característica principal del tipo catatónico de esquizofrenia es una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo o peculiaridades del movimiento voluntario</p>	<p><b>Esquizofrenia catatónica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abulia e hipobulia. ...</li> <li>• Actos en cortocircuito. ...</li> <li>• Agitación psicomotriz. ...</li> <li>• Aislamiento social. ...</li> <li>• Alogia. ...</li> <li>• Alucinaciones olfativas. ...</li> <li>• Alucinaciones táctiles. ...</li> <li>• Alucinaciones visuales</li> </ul>

DELIRIUM Y DEMENCIAS	Que es	Síntomas
<p><b>Demencia</b></p>	<p>describe un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales lo suficientemente graves como para interferir en tu vida diaria. No se trata de una enfermedad específica, hay varias enfermedades que pueden provocar demencia La demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de, al menos, dos funciones cerebrales, como la memoria y la razón</p>	<p>Los síntomas incluyen olvidos, aptitudes sociales restringidas y razonamiento tan limitado que interfiere en las actividades diarias</p>
<p><b>Delirium por enfermedad médica</b></p>	<p>es un síndrome cerebral orgánico agudo, caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas, depresión del nivel de conciencia, trastornos de la atención e incremento o disminución de la actividad psicomotora. En todos los casos es consecuencia de una enfermedad somática aguda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delirio, que es una confusión grave y repentina.</li> <li>• Temblores corporales.</li> <li>• Cambios del estado mental.</li> <li>• Agitación, irritabilidad.</li> <li>• Sueño profundo que persiste durante un día o más.</li> <li>• Excitación o miedo.</li> <li>• Alucinaciones (ver o sentir cosas que no existen)</li> <li>• Arranques de energía.</li> </ul>

## Delirium por sustancias

El delirium que se presenta como consecuencia de la intoxicación por sustancias puede desarrollarse en un período de minutos u horas después de la ingestión de dosis relativamente altas de diversas drogas como Cannabis, cocaína y alucinógenos.

No obstante, existen sustancias que por sus características (vida media larga) pueden retrasar el inicio del delirium, tal es el caso del diacepam. Aunque por lo general el delirium suele resolverse en pocas horas o días tras la desaparición de la intoxicación, existen sustancias que pueden prolongar dicho trastorno, en concreto se ha observado que la intoxicación con fenciclidina (anestésico intravenoso) prolonga la duración del delirium principalmente en individuos que padecen lesiones cerebrales, en ancianos y en individuos que están tomando simultáneamente varias sustancias. Así mismo, el tiempo transcurrido entre la toma de una sustancia y el inicio del delirium debido a intoxicación puede ser más reducido en individuos con un bajo aclaramiento debido, por ejemplo, a una enfermedad renal o hepática.

- Alucinaciones: suelen ser auditivas, generalmente voces, pero en ocasiones también alucinaciones táctiles o visuales.
- Delirios: muy habitualmente relacionados **con** la idea de ser perseguido

<p><b>Demencias por etiologías múltiples</b></p>	<p>Categoría del DSM-IV-TR que se emplea cuando existe más de una etiología como causa de la demencia. Por ejemplo un traumatismo craneal más el consumo crónico de alcohol</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pérdida de la memoria, que generalmente es notada por el cónyuge o por otra persona</li><li>• Dificultad para comunicarse o encontrar palabras</li><li>• Dificultad con las habilidades visuales y espaciales, como perderse mientras se conduce</li><li>• Dificultad para razonar o para resolver problemas</li><li>• Dificultad para manejar tareas complejas</li><li>• Dificultad para planificar y organizar</li></ul>
--	---	--

UNIDAD IV TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA	Que es	Síntomas
<b>Anorexia nerviosa</b>	<p>es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por una restricción de la ingesta alimentaria, lo que da lugar a una considerable pérdida de peso que se mantiene por debajo del mínimo esperable para la edad, sexo o el desarrollo evolutivo de cada paciente, hasta llegar en ocasiones a un estado de grave desnutrición. Esta pérdida de peso está originada por la propia paciente, a través de una disminución de la ingesta de alimentos que se acompaña frecuentemente de conductas encaminadas a perder peso: autoprovocación del vómito, uso o abuso de laxantes y diuréticos o la práctica de ejercicio físico intenso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miedo intenso a ganar peso.</li> <li>• Distorsión de la imagen corporal o verse gorda a pesar de estar muy delgada.</li> <li>• Reducción del peso por debajo de lo normal hasta llegar a malnutrición.</li> <li>• Como consecuencia del adelgazamiento extremo aparecen algunos signos físicos como piel seca y rugosa, caída del cabello, pérdida de la menstruación durante al menos 3 ciclos consecutivos.</li> <li>• Síntomas psicopatológicos como estados de tristeza, angustia, irritabilidad o aislamiento social.</li> <li>• La personalidad de estas pacientes suele ser de perfeccionismo y de autoexigencia en sus vidas, que se acompaña de una baja autoestima</li> </ul>
	<p>La bulimia nerviosa, comúnmente denominada bulimia, es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las personas con bulimia tengan en secreto episodios de atracones, es</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preocuparse por la forma del cuerpo y el peso</li> <li>• Vivir con miedo de aumentar de peso</li> <li>• Repetir episodios de comer cantidades excesivas de</li> </ul>

## **Bulimia nerviosa**

decir, que coman grandes cantidades de alimentos y pierdan el control de su alimentación, y luego vomiten, para tratar de deshacerse de las calorías adicionales de forma no saludable.

Para deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, las personas con bulimia pueden usar distintos métodos. Por ejemplo, pueden inducirse el vómito con regularidad o usar laxantes de manera inapropiada, suplementos para bajar de peso, diuréticos o enemas después del atracón. O pueden usar otras maneras de deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, como ayunar, adoptar una dieta estricta o hacer ejercicio de forma excesiva

alimentos de una sola vez

- Sentir una pérdida de control durante el atracón, como si no pudieras dejar de comer o no pudieras controlar lo que comes
- Forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón
- Usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios
- Ayunar, restringir las calorías o evitar ciertos alimentos entre atracones
- Usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso

## Conclusión

Este tema abarcado nos ayudara a la comprensión de todo tipo de trastornos que como psicólogos tenemos que saber y así comprender mejor cada una de estos contextos y saber identificar que problema se esta presentando en las personas y como poder identificar y posteriormente resolver