



Universidad Del

Sureste

Alumna:

Cecilia Del Carmen

Palomeque Vázquez

Docente:

Rosario Sanchez

Materia:

Enfermería cuidado de

la mujer

Carrera:

Lic. Enfermería

Cuatrimestre

4to

Grupo (u)

INERVACIÓN: SNS, sistema cefalorraquídeo y parasimpático.
SNP: nervio pélvico, que pierde su identidad en el ganglio cervical de Frankenhäuser

Irrigación
Arterias uterinas y ováricas
Arteria cervicovaginal

INERVACIÓN: Nervio pudendo

OVARIOS: Órganos ovoides, miden 4 cm de largo, 3 cm de ancho, y 2.5 de altura, se localiza en la porción lateral de la pelvis. Pesa 5-7. 5 gr, se sostiene gracias a un engrosamiento del ligamento ancho (mesovario). Tiene una parte central (medula) y otra externa (corteza).

IRRIGACIÓN: Arteria hipogástrica o iliaca interna
Arterias ováricas
Hemorroidal superior
Sacra media

Tres ramas: hemorroidal inferior, perineal y nervio dorsal del clítoris.

GLÁNDULAS DE SKENE: Son 2, localizadas posterolateral al meato urinario.

GLÁNDULAS DE BARTHOLIN: Miden de 0.5- 2 cm. de diámetro. Se localizan por debajo de los

HIMEN: Membrana que cubre parcialmente el

TROMPAS DE FALOPIO: Son 2 conductos de 10-12 cm de longitud por 1-2 cm de diámetro.
3 partes: intersticial, ístmica y ampular.
3 capas anatómicas: externa, media muscular e interna.

Órganos internos

Constituido por

Aparato reproductor femenino

Constituido por

Órganos externos

MEATO URINARIO: Orificio en el cual desemboca la uretra.

PERINÉ: Comprende la horquilla vulvar y ano, constituida por

ÚTERO: Órgano muscular, piriforme. La cara anterior se relaciona con la vejiga y la posterior con el recto. Mide 7-8 cm de longitud y 5-6 de ancho.
Se divide en cuerpo, istmo y cérvix.
Sus ligamentos de sostén son : a)redondos, b)anchos y de Mackenrodt, c) uterosacras. Irrigado por dos arterias, ováricas y la uterina. El ligamento ancho forma el plexo pampiniforme.

VAGINA: Entre la vejiga por delante y recto por detrás. Sirve como, conducto excretor, órgano de la cupula, conducto del parto. Mide de 8-10 cm.
Se sostiene mediante los ligamentos cardinales o de Mackenrodt y el musculo elevador del ano.

MONTE VENUS : Prominencia localizada por delante de la sínfisis del pubis, constituida por tejido adiposo.

LABIOS MAYORES: Formaciones prominentes, partiendo del monte de venus en forma de repliegues.

LABIOS MENORES: Repliegues de piel pequeños y pigmentados.

CLÍTORIS : Homologo del pene, mide 1-2 cm, situado en la parte superior del introito, encierra el meato urinario.

VESTÍBULO: **Espacio** entre labios menores, contiene el orificio