

Como se saca el IMC índice de masa corporal una medida de obesidad se determina mediante el índice de masa corporal (IMC) que se calcula dividiendo los kilogramos del peso por el cuadrado de la estatura en metros $(IMC) = \frac{\text{peso [kg]}}{\text{estatura [m]}^2}$ [kg/m²]

se termina dividiendo el peso de kilos por el cuadrado de la altura en metros (kg/m²)

Ejemplo: $IMC = \frac{45 \text{ (kg)}}{1,17^2} = 32,87$

menciona tres niveles de enfermería cuando se encuentra alterado el patrón nutricional

- Desequilibrio nutricional por exceso

- Desequilibrio nutricional por defecto

- Desequilibrio nutricional por exceso riesgo de deterioro de la deglución, deterioro de la dentición, que entendido por úlceras por presión y como se clasifican es una lesión de la piel producida secundariamente a un proceso de isquemia que puede afectar y necrosar aquellas zonas de la epidermis dermis tejido subcutáneo y músculos donde se asientan incluso pudiendo llegar a afectar articulación y hueso.

que valora la escala de bramben
evalua el riesgo de desarrollo ulceras por presion
en base a la sensibilidad y humedad de la piel
la fraccion del cuerpo con las sábanas la movilidad
actitud y nutrición del paciente

En la valoración de piel y mucosas. ¿Que podemos
valorar? Conda de inspección y de palpacion en
algunos casos es posible que se tenga que utilizar
el sentido del olfato para detectar olores no
abituales de la piel primero de inspeccionar la
lecion luego toda la piel despues las mucosas
y finalmente los anexos.