



Nombre del alumno: Shunashi Vinissa Medina Castillo

Nombre del catedrático: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Licenciatura: enfermería

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: epidemiología

Grado: 4to cuatrimestre

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12
de septiembre de 2018.

A S O C I A C I O N

Concepto

Se refiere a la existencia de un vínculo de dependencia entre una variable a otra, la forma de identificar la asociación es a través de la comparación de dos o más grupos, para determinar si la frecuencia, magnitud o la presencia de una de las variables modifica la frecuencia de la otra en algún sentido

El hallazgo

Puede deberse a un sesgo o error sistemático, o al efecto de una o más variables confusoras. Gran parte de la epidemiología clínica tiene que ver con que esto no ocurra.

Principales asociaciones de interés clínico

Asociación entre un factor de riesgo

La asociación entre la historia personal de transfusiones (variable de exposición) y la infección crónica por hepatitis C (variable de resultado)

Asociación entre un factor pronóstico

La asociación entre la presencia de hipertensión arterial y el desarrollo de insuficiencia renal crónica terminal en pacientes diabéticos

Asociación entre una intervención preventiva o promocional

La asociación entre el uso de preservativo y el contagio del VIH.

Asociación entre una intervención terapéutica o rehabilitadora

La asociación entre el uso de levotiroxina y la calidad de vida en pacientes con hipotiroidismo

Asociación entre otras formas de intervención sobre pacientes

La asociación entre la educación sobre el lavado de manos al personal de salud y tasa de infecciones intrahospitalarias

Asociación entre una intervención

La asociación entre el uso de benzodiazepinas y la aparición de dependencia.

Relación causa y efecto

El hallazgo de una asociación a través de una investigación clínica no implica necesariamente que existe una relación de causa y efecto

Riesgo

Se define como probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad o presente otro desenlace en un período de tiempo dado.

Un riesgo de muerte de 0,2 implica que ese grupo tiene un 20% de probabilidad de morir durante un período analizado

UDS. Universidad del sureste. 2020. Antología de Epidemiología. PDF. Recuperado el 24 de septiembre del 2020.