



Diego Solorzano Deleón

Super nota

Materia: PRÁCTICA CLINICA

Grado y grupo: 7 A

TÉCNICAS ESPECIALIZADAS DE LA UCI



PROCEDIMIENTOS RELACIONAS CON DIFERENTES PUNCIONES

Procedimiento para la extracción de líquido del espacio abdominal. Puede ser un procedimiento diagnóstico (para extracción de muestra) o terapéutico (Drenaje de líquido para disminuir la presión intraabdominal).

Tipos Según el objetivo perseguido, la paracentesis puede ser de dos tipos:

Diagnóstica:

Consistente en la obtención de una muestra de líquido peritoneal para su estudio.

Evacuadora o terapéutica:

Consiste en evacuar el líquido acumulado en exceso dentro de la cavidad peritoneal, para descomprimir el abdomen y mejorar los trastornos de circulación provocados por la Ascitis.



MEDICACIÓN EN LA UCI

ASPIRINA
ENOXAPARINA
HEPARINA SÓDICA NO FRACCIONADA E.V
TIROFIBAN (Agrastat)
Amilodipino (Norvas)
BENADRYL 50 mgrs V.O.
VALIUM 10 mgrs V.O.

NUTRICION PARENTERAL:

Proporcionar todos los principios nutritivos necesarios para mantener al paciente y promover su recuperación.



¿CUALES SON LAS TECNICAS?

Monitor cardio respiratorio o cardíaco. ...
Monitor de presión arterial. ...
Oxímetro de pulso. ...
Monitor de oxígeno/dióxido de carbono transcutáneo. ...
Radiografía. ...
Tubo endotraqueal (tubo ET). ...
Respirador o ventilador mecánico. ...
Sonda pleural.



CONTROLES ANALÍTICOS DE LA UCI

En nuestro servicio, la forma preferente para realizar la extracción de sangre, es a través de vía venosa central. También se podrá extraer sangre de vía venosa periférica en casos concretos y se deberá extraer directamente de vena o de arteria, cuando se piden hemocultivos.

Controles rutinarios:

Es una analítica que se extrae una vez a la semana por protocolo, normalmente todos los lunes a la mañana, que sirve para tener una visión analítica global del paciente.



¿QUE ES LA U.C.I.?

Es el lugar en donde se brindan cuidados de alta complejidad para los pacientes graves de otros servicios del hospital.

Para identificar la gravedad existen dos condiciones cuando el paciente está muriendo o cuando el paciente tiene un riesgo real o potencial de que pueda fallecer.

Esa gravedad define la necesidad de que haya un ambiente en donde se pueda monitorear y controlar los órganos comprometidos del paciente y reciba cuidados especiales.