



Nombre de alumnos: Lizbeth Fidelia Morales Cruz

Nombre del profesor: Lic. María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Enfermería en el cuidado del niño y del adolescente

Grado: 7ºto cuatrimestre

Grupo: "A"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de septiembre del 2020.

MADURACION PSICOMETRIZ

Desarrollo

Constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez

El niño tiene que pasar por una serie de etapas precedentes del desarrollo.

Para hacer un diagnóstico del desarrollo es necesario estar familiarizado con todos los etapas

Etapas de la maduración

En el primer trimestre esta regido por reflejos arcaicos

En el segundo trimestre surge motoras pero y apacible

En el tercer trimestre el niño es curioso e inactivo

Al término de la vida trimestre el logro más importante es el inicio de la marcha por medio la madurez neuromuscular.

Tono Muscular

Es un estado de tensión permanente de los músculos.

El estado senile del tono comienza con la maduración del niño despierto.

La maduración consiste en tener a plena marcha la masa muscular en estado generalmente del estado.

Reflejos Arcaicos

Son reacciones automáticas desencadenadas por la estimulación de diferentes receptores

Los reflejos fijan el ritmo del desarrollo psicometriz.

A medida que avanza el desarrollo neurológico los estímulos que desencadenan los reflejos.

C.3.4

MADURACIÓN
CDEA

El crecimiento
y maduración

Son dos procesos biológicos altamente relacionados pero no son iguales en la infancia.

El primer episodio de maduración sucede entre los 10 y 12 años.

Podría considerarse un signo de alerta ante la maduración precoz de un sujeto clínico.

Método de medición de la edad ósea

Los diagnósticos más comunes de la edad ósea en los niños son: retraso o adelanto.

Existen métodos como el método de Greulich y Pyle.

Existe el uso de la edad ósea en la evaluación de la nutrición y el crecimiento.

Episodio de la falange distal

Se observan al menos dos los metacarpos y es reconocible entre los 13 meses en mano y 18 meses en pie.

Episodio de la falange media

Se observa con frecuencia después en el mismo lugar.


Valoración de los cambios de la edad ósea.

Existen diagnósticos más comunes para el estudio del crecimiento de talla adulta.

La edad ósea retrasada en los niños se asocia con talla baja - estatura.

En los casos con talla baja y antecedentes de crecimiento inadecuado, la edad ósea retrasada hace los 8 años.

"CAVIDAD ORAL"



Evaluación de enfermería: Para realizar un buen examen diagnóstico de la boca requiere que pongamos la máxima de nuestros sentidos. La inspección por visión directa o indirecta deben realizarse con buena iluminación, la palpación con los yemas de los dedos debe ser hecha con gran cuidado ser digital o bidental, la exploración nos ayuda en el diagnóstico de algunas patologías que tienen mal olor.

¿Qué se debe realizar?

- Valoración de la ATM
- Valoración de los carrillos
- La oclusión dental
- Glandulas salivales
- Valoración de mucosas
- Integridad y color

Bibliografía

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/4f161c5247196069737b7f7443c273d1.pdf>