



Nombre del alumno: Laura Isela López Rodríguez

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre del trabajo: cuadros sinópticos

Materia: Enfermería en el cuidado del niño y del adolescente

Grado: 7mo cuatrimestre

Grupo: "A"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a miércoles 24 de septiembre de 2020.

1.3.3 MADURACIÓN PSICOMOTRIZ.

Proceso continuo hasta la madurez.

Pasan diferentes etapas

Precedentes del desarrollo.

Tono muscular

va aumentando firmeza

Etapas de la maduración.

Maduración sensorio motora.

El lactante en los primeros 3 meses.

Movimientos regulados

Por impulsos
cambios tónicos asimétricos

instalación ocular

En los primeros 15-20 días
Primera sonrisa y balbuceo

Miembros Superiores

Las dedos cierran los puños
Rodillos se flexionan.

En el 2do trimestre.

Etapas de sonrisas
Liberación del reflejo tónico

3er trimestre

Inquieto y curioso
Angustia
Codos a la boca.
Flexión del codo

4to trimestre

Madurez neuromuscular.
Posición sentada
10 meses
Dice sílabas

crecimiento y maduración del individuo { Son 2 procesos biológicos relacionados. Pero paralelos a lo largo de la vida. } cada niño tiene un tiempo de maduración propia, por su edad cronológica. El único indicador de maduración es la ósea.

método de medición ósea { En 1898 el de G.P. Tanner Sencillo } El primero es sencillo y compara el grado de madurez ósea - para la edad } El segundo requiere de más tiempo y se basa en la aplicación de puntuaciones de madurez.

1.3.4 MADURACIÓN ÓSEA

Proceso de Osificación { Al nacer todas las diafisis tienen que estar osificadas mientras las epifisis son cartilaginosas. } Al nacimiento la epifisis son cartilaginosas y se osifican. } Hasta lo que es la edad adulta. Por diferentes factores genéticos, o ambientales socioeconómicos y hormonales entre otros.

infancia precoz { [RN - 10 meses (♀); RN - 14 meses (♂)] }

Edad Preescolar { [10 meses - 2 años (♀); 14 meses - 3 años (♂)] } Huesos largos de la mano.

Etapa escolar { [2-7 años (♀); 3-9 años (♂)] y pubertad (Tanner 2-3/4) [Hasta 13 años (♀); hasta 14 años (♂)].

Pubertad { (Tanner 3-4/5) [13-15 años (♀); 14-15 años (♂)]. Fusión de epifisis

Postpubertad { [15-17 años (♀); 17-19 años (♂)] metacarpians, falanges y hueso carpo desarrollados.