

## Tema: Súper Nota




- 
- **NOMBRE DEL ALUMNO:** Exar Rubeli García Hernández
  - **DOCENTE:** Felipe Antonio Morales Hernández
  - **CARRERA:** Lic. Enfermería
  - **CUATRIMESTRES:** 7 "B"
  - **MATERIA:** Practica Clínica de Enfermería

**COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS, A 13 DE  
NOVIEMBRE DE 2020**

# TECNICAS ESPECIALES DE UCI

## MARCAPASO TEMPORAL


El objetivo del marcapasos temporal es mantener la FC hasta que la disrritmia critica haya pasado.



PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS  
CON DIFERENTES PUNCIÓNES

PARACENTESIS

DEFINICION: Procedimiento para la extracción de líquido del espacio abdominal.



TIPO (DIAGNOSTICO)  
Consiste en la obtención de una muestra de líquido peritoneal para sus estudio.


TIPO (TERAPEUTICO)  
Consiste en evacuar el líquido acumulado en exceso dentro de la cavidad peritoneal.

TORACOCENTESIS

La toracentesis es una técnica significativamente molesta utilizada para analizar y tratar las radiaciones pleurales.

OBJETIVO


- EVACUAR LIQUIDO
- PUNCION DIAGNOSTICA



Es una prueba que tiene como objetivo recoger el líquido cefalorraquídeo, para esto, se introduce una aguja hueca en la parte inferior de la espalda en la columna vertebral.

## PUNCION LUMBAR

La punción lumbar es que permite un diagnóstico rápido y fiable.




síntomas

- ✓ Dolor sordo y pulsátil
- ✓ Dolor al ponerte de pie
- ✓ Mareos y zumbidos

Es un procedimiento que utiliza una aguja para extraer líquido del saco pericárdico.

## PERICARDIOSENTESIS

El proceso se realiza con mayor frecuencia en una sala de procedimientos especiales.



riesgos

- sangría
- pulmón colapsado
- ataque al corazón
- infección
- latidos irregulares
- punción del musculo cardiaco

# CONTROLES ANALITICOS EN UCI

En nuestro servicio, la forma preferente para realizar la extracción de sangre, es a través de vía venosa central.



## PROCEDIMIENTOS

### SISTEMA DE EXTRACCION POR VACIO

- conectar sistema de vacío a la vía y desechamos 10 cc con un tubo rojo
- conectamos los tubos necesarios al sistema para extraer la sangre
- lavamos la vía y colocamos un tapón estéril
- llenamos los tubos necesarios.

### PROCEDIMIENTOS CON JERINGAS

- Cargar 20 cc de suero fisiológico
- usar para la vía de extracción
- la misma jeringa se utiliza para extraer 10 cc de sangre
- usaremos una jeringa limpia para extraer la cantidad de sangre
- lavar la vía con otra jeringa
- limpiar la llave de tres pasos

## RUTINAS

INGRESO A PACIENTES INTENSIVOS

CONTROLES RUTINARIOS

RUTINAS DE LIQUIDOS BIOLÓGICOS



# MEDICACION EN UCI

ASPIRINA

Salvo contraindicación absoluta se administra 30 mg de AAS, cuanto antes mejor, seguidos de 100 mg/ 24 hrs.



ENOXAPARINA

Es heparina de bajo peso molecular, se administra 1 mgr/ kg, cada 12 horas por vía S.C y se mantendrá hasta el alta hospitalaria.

HEPARINA SODICA

Se administra como alternativa a la Enaxoparina, se administrará un bolo de perfusión que se mantendrá entre 24 y 48 horas.



TIROFIBAN

Indicado en la prevención de IAM, precoz en pacientes con angina inestable o IAM, sin onda Q cuyo último episodio de dolor haya sido en las últimas doce horas y que presenta cambios de ECG.

EL AGRASTAT

Esta destinado a ser usado con ácido acetil salicílico y heparina no fraccionada.



ANTAGONISTA DE CALCIO

Amilodipino, 5 mg oral cada 12 horas, siempre asociado a betabloqueantes a otro antagonista

OBJETIVO

Proporcionar todos los principios nutritivos necesarios para mantener al paciente y promover su recuperación.

## BIBLIOGRAFIA:

ANTOLOGIA UDS/ PRACTICA LINICA DE ENFERMERIA/ LIC. F.A.M.H./ SUPER NOTA, / III PARCIAL.