



Nombre del alumno:

Cinthia Pérez García

Nombre del profesor:

Felipe Antonio Morales

Nombre del trabajo:

Super Nota

Materia: Practica de Enfermería II

Grado: Séptimo Cuatrimestre

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de noviembre de 2020.

SUPER NOTA

3.1 Técnicas especiales de U.C.I.

Marcapasos Temporal

Mantener la FC hasta que la disritmia crítica haya pasado.

Marcapasos Epicutáneo/ Transtorácico

Permite estimular la contracción ventricular en presencia de bloqueos AV o bradicardia sincopal, mediante la colocación de dos electrodos adhesivos.

Contrapulsación Aórtica

Dispositivo de asistencia al ventrículo izquierdo que mejora perfusión arterial coronaria y reduce la postcarga sistémica por contrapulsación.

Cateterismo Cardíaco/ Angioplastia (ACTP)

Es una exploración para fines diagnósticos pasando a denominarse ACTP.

Cardioversión Eléctrica y Desfibrilación externa

Consiste en administrar una corriente eléctrica a través de dos electrodos adhesivos o unos polos de desfibrilador colocados en la pared torácica.

3.2 Procedimientos relacionados con diferentes punciones.

Paracentesis

Procedimiento para la extracción de líquido del espacio abdominal



Consiste en evaluar el líquido acumulado en exceso dentro de la cavidad peritoneal



Procedimiento

- Preparación del paciente
- Pediremos que orine para vaciar la vejiga
- Preparar el campo estéril
- Pedir al paciente que este quieto y Tranquilo
- Paracentesis evacuadora, preparar los tubos
- Al retirar el cateter colocar un apósito en el lugar de la punción.

Toracocentesis

Utilizada para analizar y tratar las radiaciones pleurales, una afección en la que hay líquido innecesario.



Procedimiento

- Sentar al paciente al revés de la silla
- Desinfección de la piel de la zona a puncionar
- Infiltrar un anestecico local
- Puncionar en la línea axilar media a la altura de 7mo-8vo, Espacio Intercostal.

Punción lumbar

Prueba para recoger el líquido cefalorraquídeo



El líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril compuesto en un 99% de agua, que protege el cerebro amortiguando los golpes.



Riesgos y consecuencias

Riesgo de infección

Riesgo de sangrado

Riesgo de tener cáncer

Fuertes dolores de cabeza o náuseas

Síndrome post-punción lumbar

Pericardiocentesis

Se utiliza para extraer líquido del saco pericárdico.


Es el tejido que rodea el corazón



Procedimiento

- Laboratorio de cateterismo cardíaco
- Colocar una vía intravenosa
- Limpiar el área justo debajo del esternón
- Aplicar anestésico
- El médico, insertará una aguja y la guiará hacia el tejido que rodea el corazón.

Riesgos



- Sangría
- Pulmón colapsado
- Ataque al corazón
- Infección
- Latidos irregulares
- Punción del músculo cardíaco
- Neumopericardio

3.3 Controles analíticos en U.C.I.

Extracción de sangre
es a través de vía venosa
central, también se puede
de vía venosa periférica.

Material

- 2 jeringas de 10 cc
- 20 cc de suero fisiológico
- 1 jeringa de (5, 10, 20 cc)
- Tubos analíticos precisos
- Gasas
- Guantes no esteriles
- Aguja intravenosa

Procedimiento

Cargar los 20 cc de suero fisiológico
en las 2 jeringas

Usamos una de ellas para
lavar la vía

Usar una jeringa limpia
para extraer la cantidad de
sangre

Limpieza la llave de 3 pases
y colocar un tapon esteril

Conectamos el sistema de vacío
Llenamos los tubos necesarios

Rutinas de líquidos Biológicos

- Estudios de líquido cefalorraquídeo
- Estudios de líquido ascítico
- Estudio de líquido pleural
- Estudio de líquido pericárdico

3.4 Medicación en U. C. I.

Aspirina

Se administraron 300 mg de AAS en vía oral al ingreso.

Enoxaparina

Es heparina de bajo peso molecular, se administrara 1 mg/kg

Heparina Sódica No Fraccionada

Se administra como alternativa a la Enoxaparina, adm. un bolo seguido de perfusión.

Tirofiban

Indicado en la prevención del IAM precoz en pacientes con angina inestable o IAM sin onda Q.

Antagonistas del Calcio

5 mg oral cada 12 h. Siempre asociado a Betabloqueadores o a otro Antagonista

IECA

Se pauta con pacientes de IAM extenso, IAM previo, signo de ICC, FE < 40% o cualquier indicador de disfunción ventricular.

Protocolo para cateterismo

Se administrara a todos los pacientes, excepto alergia a dicho fármaco

Buenas noches profesor

Una disculpa por enviar mi actividad en la libreta, ya que por motivos técnicos de la computadora no lo pude realizar, comprendo si no tengo la calificación correspondiente, gracias por su comprensión.