

Nombre del alumno:

López Vázquez Osvaldo Rafael

Materia:

***Enfermería en urgencias y
desastres***

***Grado: 7 Mo cuatrimestre grupo:
"B"***

Docente:

***Marcos jhodany Arguello Gálvez
Carrera:***

Lic. En enfermería general

Soporte vital básico

Se compone de

Cuatro principales componentes

Las cuales son

- ❖ Compresiones torácicas
- ❖ Vías aéreas
- ❖ Ventilación
- ❖ Desfibrilación

Paso 1

Evaluación y seguridad de la escena

El primer

Reanimador que llegue junto a la víctima

Debe

Asegurarse rápidamente de que la situación es segura

Acciones del reanimador

Asegurarse rápidamente de que la situación es segura para usted y para la víctima

Golpear a la víctima en los hombros y preguntar si se encuentra bien

Paso 2

Activación del sistema de respuesta a emergencia

Si se encuentra solo

Ante una víctima que no responde gritar para pedir ayuda

Si no acude nadie

Activar el sistema de respuesta a emergencia

Conseguir un

DEA si está disponible

Regresar con la víctima para comprobar si tiene pulso e iniciar RCP

Paso 3

Comprobación del pulso

El pulso en adultos se palpa sobre la arteria carótida

Si no se detecta

Se inicia compresiones torácicas

100 compresiones por minuto, permitiendo que el tórax se expanda

Una frecuencia de

Paso 4

Se inicia los ciclos de las compresiones de 30 compresiones y 2 ventilaciones

Si el reanimador esta solo

Debe de usar la relación de compresiones/ventilaciones

De

30 compresiones y 2 ventilaciones cuando se realice RCP

Aplicar las compresiones torácicas es imposible presionar el tórax con fuerza y rapidez

