



Nombre del alumno: Cinthia Pérez García

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano

Nombre del trabajo: Maduración Psicomotriz,
Maduración Ósea, Autovaloración de la cavidad oral.

Materia: Enfermería en el cuidado del niño y
adolescente

Grado: Séptimo Cuatrimestre

Grupo: "B"

1.3.3 Maduración Psicomotriz

El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez

Etapas de la maduración psicomotriz

Maduración sensorio motora del lactante durante el primer trimestre de vida. La fijación ocular se instala entre las 15 a 20 primeros días. El tronco, permanece en la línea media. En los miembros superiores las manos quedan próximas de los hombros.

Del lactante en el segundo trimestre de vida.

Es la edad de las grandes sonrisas y del interés por el rostro del ser humano. El tronco permanece bien afirmado sobre el plano de apoyo. Los cuatro miembros han perdido la rigidez de muñeca pero sin ángulos agudos. Liberación del reflejo tónico cervical asimétrico. Movimientos más finos

Del lactante en el tercer trimestre de vida.

El niño es inquieto y curioso, está adquiriendo conciencia de sí mismo y toda ocasión le es buena para explorar y conocer su cuerpo. El tronco puede mantenerse apoyado contra la superficie o rotarlo activamente alineándolo contra la cabeza. La curiosidad se centra en sus pies. Maniobras que fuerzan la elasticidad de músculos.

Del lactante en el cuarto trimestre de vida.

Inicio de sus primeras pasas, inicia un periodo de intensa exploración del medio. Del decúbito dorsal pasa fácilmente a la posición sentada y alcanza inclinándose hacia adelante los objetos que le interesan. Al rededor de los 10 meses termina el lenguaje, reflejo propiamente dicho y comienza el lenguaje simbólico engarzado en las primeras sílabas.

1.3.3 Maduración psicomotriz

Bases neurológicas de la maduración psicomotriz

El tono muscular

Un estado de tensión permanente de los músculos, de origen esencialmente reflejo, variable. Es una actividad regida por el sistema nervioso central. La maniobra semiológica consiste en tomar a plena mano la masa muscular en estudios de deltoides.

Reflejos arcaicos

Los reflejos fijan el ritmo del desarrollo psicomotriz. A medida que avanza el desarrollo neurológico en los estímulos se desencadenan los reflejos y eso va provocando respuestas automáticas.

El crecimiento y maduración del individuo son dos procesos biológicos íntimamente relacionados. Aun que la madurez de los huesos examinados en la valoración de la EO sólo expresa una parte del proceso de maduración.

Metodo de medición de la edad ósea,

1.3.4

Maduración Ósea

El grado de madurez de los centros de osificación con su estandar para la edad, por otra parte requiere mas tiempo para su realización y se basa en la aplicación puntuaciones o scores de madurez en los diferentes huesos de la mano y muñeca

Proceso de osificación

Todas las diafisis deben estar osificadas, mientras que las epifisis son cartilaginosas, tras el nacimiento, las epifisis comienzan a osificarse pero influenciado por diversos factores genéticos, ambientales y hormonales.

Edad preescolar o infancia tardia

Se indentifican los nucleos de osificación de las epifisis en los huesos largos de la mano. En la fase de la pubertad, la valoración de sus folajes con sus respectivas metafisis.

1.3.4

Maduración

Osea.

Aspectos prácticos para la valoración de los cambios de la edad ósea

La valoración de la EO es siempre recomendable como parte de la rutina del estudio de los niños con problemas de crecimiento, tanto con motivos diagnósticos como pronósticos. En este sentido, existen diversos métodos orientativos para el cálculo del pronóstico de talla adulta.

Talla


El pronóstico de talla adulta en más/menos 5 cm de la talla diana, nos orienta hacia la concordancia de la talla del niño con la de sus padres.

La EO está frecuentemente retrasada en los pacientes con talla baja idiopática.

La ausencia de retraso en los pacientes con déficit de GH.

Los pacientes con talla baja y antecedentes de crecimiento intrauterino retardado, la EO está generalmente retrasada hasta los 8 años.

Cavidad Oral



Patologías

- * Gingivitis
- * Diastema

Valoración de Enfermería:

Paciente femenino, presenta enrojecimiento en las encías, coloración y mucosa normal, separación entre los dos incisivos centrales superiores, labios simétricos, dientes bien implantados con coloración normal, paladar duro y blando con buena consistencia, lengua con un buen tono brillante, lisa sin ninguna masa anormal.

Bibliografía

María Cecilia Zamorano, 2020. Antología "Enfermería en el Cuidado del Niño y Adolescente", Campus Comitán de Domínguez Chiapas. Universidad del Sureste