

**Enfermería en el cuidado del niño y el adolescente**

**Catedrático(a):** Prof.(a) María Cecilia Zamorano  
Rodríguez.



**Cuadro sinóptico**

**Alumna:** Araceli Guadalupe García Aguilar

**7to. Cuatrimestre Grupo "B"**

Comitán de Domínguez, Chiapas. 24 de septiembre de 2020

Maduración sensorio motora del lactante durante el primer trimestre de vida.

Regido por reflejos arcaicos, evidentes en actitudes posturales y movimientos regidos por impulsos

Maduración psicomotora en el segundo trimestre de vida

En contraste con la actividad inabarcable, suele mostrarse el niño sereno y apacible.

1.3.3

Maduración psicomotriz

Maduración psicomotora en el tercer trimestre de vida.

El niño es inquieto y curioso, adquiere conciencia de sí mismo y toda ocasión le es buena para explorar y conocer su cuerpo.

Maduración psicomotora en el cuarto trimestre de vida.

Logró más importante. Inicio de la marcha bípeda, madurez neuromuscular alcanzada.

Bases neurológicas de la maduración psicomotriz.

Tono Muscular

Estado de tensión permanente de los músculos.

Reflejos Arcaicos

Reacciones automáticas desencadenadas por la estimulación de receptores y adecuación del individuo al ambiente

Crecimiento  
y  
Maduración

son procesos biológicos íntimamente relacionados, no siempre van paralelos a lo largo de la infancia y adolescencia

Indicador  
aceptado  
de maduración

válido desde el nacimiento hasta la madurez, es la edad ósea (EO).

1.3.4

Maduración  
Ósea

Método de  
medición ósea

Greulich y pyle

Ampliamente aceptado por ser sencillo, se basa en la comparación del grado de madurez de los centros de osificación, según la edad.

Tanner whitetouse


Requiere tiempo para su realización, se basa en la aplicación de puntuaciones o -scores.

Proceso  
de osificación

Al nacimiento, las diafisis deben estar osificadas.

Los centros de osificación no tienen el mismo valor predictivo de maduración en las distintas edades.

# "CAVIDAD ORAL"



## PATOLOGÍA:

"Presencia de caries"

## VALORACIÓN:

PX: presenta coloración y mucosa normal, no existe ausencia de dientes, paladar duro y blando con buena consistencia, lengua con buen tono, no presenta anomalías, solo en los molares inferiores por presencia de caries ha llevado tratamiento de aplicación de rellenos. También existe la aparición del tercer molar superior izquierdo.

## **Bibliografía**

Rodríguez., M. C. (s.f.). Antología enfermería en el cuidado del niño y el adolescente. PDF. Obtenido de Antología. PDF.