



**Nombre del alumno:
Mauricio Alejandro Gómez Aguilar.**

**Nombre del profesor:
Marcos Jhodany Arguello.**

**Materia:
Enfermería en urgencias y desastres.**

**Grado:
Séptimo.**

Grupo:

“C”

Soporte vital básico

¿Que es?

en esta sección se describen los pasos básicos de la RCP para adultos

entre los adultos, se incluyen los adolescentes.

Los signos de pubertad incluyen

la presencia de vello en el tórax o antebrazos en varones

desarrollo mamario en mujeres

fundamentos

compresiones torácicas, vía aérea, ventilación, desfibrilación

pasos iniciales

Paso 1: evaluación y seguridad de la escena

asegurarse de la situación para usted y la víctima

comprobar si la víctima esta bien, si respira, al no tener eso activar el sistema de respuestas emergencias.

Paso 2: Activación del sistema de respuesta a emergencias y obtención de DEA.

sistema de respuesta a emergencias, consiga un DEA, si esta disponible y a continuación, regrese con la víctima para comprobar el pulso e iniciar la RCP

Paso 3: comprobación del pulso

Para comprobar el pulso en un adulto, palpe sobre la arteria carótida. Si no detecta pulso al cabo de 10 segundos, inicie las compresiones torácicas

pasos iniciales

Paso 4: inicio de los ciclos

Si el reanimador esté solo, debe usar la relación de compresión/ventilación de 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando realice la RCP a víctimas de cualquier edad.

Ventilación de boca a dispositivo de barrera de adultos

La válvula unidireccional permite que la respiración del reanimador entre en la boca y la nariz de la víctima y desvía el aire que exhala la víctima del reanimador.

El reanimador que se encuentra solo sujeta la mascarilla contra el rostro de la víctima y abre la vía aérea con una extensión de la cabeza y elevación del mentón.