



Nombre del alumno:

Christian Acevedo Lavalle

Nombre del profesor:

Cecilia Zamorano

Materia:

Enfermería en el cuidado del niño y adolescente

Nombre del trabajo:



Cuadro sinóptico

Grado y Grupo:

7° "C"

PASIÓN POR EDUCAR

“CAVIDAD ORAL”



Valoración sistemática de la boca de su paciente:

Sangrado (gingival, de la mucosa oral, estado de coagulación del paciente). Enrojecimiento (gingival, de la lengua, boca seca, estomatitis antibiótica). Ulceración (tamaño y forma de las úlceras, úlcera herpética, úlcera aftosa). Saliva (fina/acuosa, gruesa, cantidades copiosas, boca seca). Halitosis (tipo, ausencia de). Factores externos (grietas y enrojecimiento en las comisuras de la boca, dispositivo de seguridad o cinta adhesiva para mantener el tubo endotraqueal, higiene). Detritos (placa visible, sustancias extrañas, presencia de tubo endotraqueal con cinta adhesiva o dispositivo de seguridad).

Maduración Precoz

¿Que es?

Es un desarrollo que constituye un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez

No debe entenderse simplemente como la presentación subjetiva de acontecimientos importantes.

Etapas de la maduración

Maduración sensoriomotora del lactante durante el primer trimestre de vida.

La conducta del lactante está regida por reflejos de sus actitudes posturas y movimientos

Maduración psicomotora en el segundo trimestre de vida.

Suele mostrarse sereno y apacible, edad de las grandes sonrisas indiscriminadas.

Maduración psicomotora en el tercer trimestre

El niño es inquieto y curioso, está adquiriendo conocimiento de si mismo.

Cuarto trimestre

La madurez neuromuscular alcanzada permite dar sus primeros pasos.

Tono muscular

Es un estado de tensión permanente de los músculos de origen esencialmente reflejo, variable cuya misión fundamental tiende al ajuste de las posturas locales y de la actividad general.

Maduración Ósea

¿Qué es?

Es el crecimiento y maduración del individuo, son dos procesos biológicos íntimamente relacionados pero no siempre van paralelo a lo largo de la infancia y la adolescencia.

Proceso de osificación

Al nacimiento todas las diafisis deben estar osificadas

Mientras que la mayoría de las epifisis son cartilaginosas

Epifisis de falange distal del pulgar

Se desarrolla al tiempo que los metacarpios y es reconocible

Entorno a los 15 meses en niños y 18 meses en niñas

Epifisis de la falange medio

5º dedo con frecuencia osifica en último lugar.

Durante la pubertad

Aparecen los centros de osificación del aductor del pulgar

y el pisiforme pero no son buenos indicadores de maduración ósea.

En la fase de la pubertad avanzada.

La valoración de la maduración ha de centrarse en el grado de fusión de la epifisis

de las falanges con sus respectivos metafisis.