

TEMA:

- **DOCENTE:** ANA GABRIELA VILLAFUERTE AGUILAR
- **NOMBRE DEL ALUMNO:** ANDREA CASTRO HIDALGO
- **CARRERA:** MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
- **CUARRIMESTRE:** 7to
- **MATERIA:** ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

ZOOTECNIA DE P. ESPECIES

CLASIFICACIÓN DE LOS PERROS DOMÉSTICOS DE TIPO PRIMITIVO.

Esta clasificación se desarrolló en 1897 por el señor Megnin Pierre Médico Veterinario, en cuatro tipos distintos en función de la forma de la cabeza.

L: Lipoides

M: Molosoides

B: Bracoides

G: Graioides

Lupoides Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma de pirámide horizontal, orejas normalmente erectas, hocico alargado, labios pequeños y apretados sin que el labio superior supere la base de las encías inferiores, la depresión naso frontal o stop muy poco marcada.

Molosoides Son todos aquellos que tienen una cabeza voluminosa, redonda o cuboide, orejas pequeñas y caídas, hocico corto y labios son largos y gruesos, stop bastante pronunciado y normalmente son de gran estatura y de cuerpo macizo.

Bracoides Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma prismática, hocico cuadrado y separado de la frente por una depresión naso frontal o stop bastante marcado, orejas caídas y los labios son largos y colgantes superando el labio superior el nivel del maxilar inferior.

Graioides Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma de cono alargado, cráneo reducido y las orejas pequeñas vueltas hacia adentro y erguidas o semiderruidas, hocico largo y delgado y la depresión naso frontal o stop es mínima.

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DEL CRÁNEO.

Puede ser de tres tipos:

Dolicocefalo: cuando es más largo que ancho. "lipoides y graioides en general".

Braquicefalo: cuando es más ancho que largo. "molosoides en general".

Mesocefalo: Cuando el cráneo es igual de ancho que de largo. "Bracoides en general".

Forma de medir el craneo de un perro.

La longitud se mide desde el occipucio hasta las fosas nasales y el ancho desde los puntos más externos del arco cigomático.