

ensayo



- **nombre del alumno:** ezequiel vazquez garcia
- **carrera:** medicina veterinaria y zootecnia
- **cuatrimestres:** septimo
- **materia:** zootecnia de pequeñas especies
- **maestro:** ana gabriela villafuerte aguilar

I.7 CLASIFICACIÓN DE LOS PERROS DOMÉSTICOS DE TIPO PRIMITIVO.

Esta clasificación se desarrolló en 1897 por el señor Megnin Pierre Médico Veterinario, en cuatro tipos distintos en función de la forma de la cabeza.

L: Lipoides
M: Molosoides
B: Bracoides
G: Graioides

Lupoides

Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma de pirámide horizontal, orejas normalmente erectas, hocico alargado, labios pequeños y apretados sin que el labio superior supere la base de las encías inferiores, la depresión naso frontal o stop muy poco marcada. Ejem: Pastor Alemán, Alaska Malamute, Samoyedo, Pastor Belga, Doberman etc.

Molosoides

Son todos aquellos que tienen una cabeza voluminosa, redonda o cuboide, orejas pequeñas y caídas, hocico corto y labios son largos y gruesos, stop bastante pronunciado y normalmente son de gran estatura y de cuerpo macizo.

Bracoides

Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma prismática, hocico cuadrado y separado de la frente por una depresión naso frontal o stop bastante marcado, orejas caídas y los labios son largos y colgantes superando el labio superior el nivel del maxilar inferior.

Graioides

Son todos aquellos que tienen la cabeza en forma de cono alargado, cráneo reducido y las orejas pequeñas vueltas hacia adentro y erguidas o semiderruidas, hocico largo y delgado y la depresión naso frontal o stop es mínima, labios cortos y apretados y el cuerpo alargado con el vientre muy retraído

I.8 CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DEL CRÁNEO.

Craneo:

Puede ser de tres tipos:

Dolicocefalo: cuando es más largo que ancho. "lipoides y graioides en general".

Braquicefalo: cuando es más ancho que largo. "molosoides en general".

Mesocefalo: Cuando el cráneo es igual de ancho que de largo. "Bracoides en general".

Stop o depresion nasofrontal

Es el punto superior de inserción del hocico en el cráneo, dependiendo de la raza, puede ser más o menos marcado o inexistente.

Forma de medir el craneo de un perro

La longitud se mide desde el occipucio hasta las fosas nasales y el ancho desde los puntos más externos del arco cigomático.