

# Zootecnia de pequeñas especies

## Medicina veterinaria y zootecnia

**Maestra: Ana Gabriela Villafuerte Aguilar**

**Alumna Jeni Lizbet López Aguilar**



# Zootecnia de pequeñas especies

---

## Hipersexualidad

hay dos mecanismos distintos que controlan el comportamiento sexual: las hormonas sexuales masculinas y partes del córtex cerebral.

Estos sistemas están relacionados porque se cree que los esteroides, incluyendo las hormonas sexuales

La hipersexualidad es, en esencia, un comportamiento sexual excesivo o aberrante

Es importante apreciar que existen grandes diferencias en cuanto a la dependencia relativa del comportamiento sexual a los andrógenos y al córtex cerebral

**engloba un comportamiento sexual normal que queda fuera de lugar en la sociedad actual, y se manifiesta en forma de:**

- Agresividad.
- La monta de otros perros, personas y objetos inanimados.
- El marcado territorial, especialmente la micción en casa.
- El vagabundeo.
- Comportamiento destructivo.

**Las perras son atractivas para los machos durante, aproximadamente, 9 días, mientras están en proestro.**

El apareamiento se da cuando la hembra está en celo y tiene el reflejo de inmovilidad.

En el caso del perro, la penetración se consigue sin erección gracias a la presencia del hueso peneano

# DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN

---

Desde el estro hasta el parto es de un 36% (rango: 20-55%), dándose el incremento más notable en el último tercio de la gestación

Suele poder apreciarse un cambio en la forma corporal alrededor del día 56 de la gestación, y alrededor de esta época pueden notarse también movimientos fetales

Los pezones aumentan de tamaño y el desarrollo mamario se da durante la segunda mitad de la gestación

## Palpación abdominal

La palpación abdominal, generalmente 3-4 semanas tras el apareamiento, suele ser usada para el diagnóstico de gestación en la perra

Aunque los falsos positivos por parte de un veterinario experimentado son raros, es difícil asegurar que una perra no esté gestante

Podemos encontrarnos con problemas en el caso de algunas razas, los animales gordos y en las perras que esconden el abdomen

## Radiografías

Las radiografías pueden usarse para confirmar una gestación canina, pero los esqueletos de los fetos no se tornan radiopacos hasta el día 45

## Ultrasonografía

La ultrasonografía puede usarse para visualizar las vesículas fetales a partir del día 16-20 de la gesta-