



MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  
ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

Séptimo cuatrimestre grupo A

Mayo - Agosto

IAZ. Ana Gabriela Villafuerte

Alumno: José Eduardo Roblero Tovar

Actividad: SUPER nota

Comitán, Chiapas.

## INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo tiene como finalidad mostrar de una manera gráfica cuales son las características principales de los felinos así como su tipo de pelajes,, longitud etc.

Es importante conocer estas particularidades para poder identificar el tipo de raza que se nos presente

# Clasificación morfológica de las razas de gatos.

Se refieren a las características morfológicas y a la estructura del animal

Las razas de gatos se diferencian por su conformación y tipo de pelaje. Por su conformación, se diferencian tres tipos:


## Tipo oriental exótico

De cuerpo esbelto y alargado, extremidades largas y finas. La cabeza es fina, alargada, de orejas grandes y próximas en su nacimiento, escaso o nulo escalón frontonasal y nariz alargada. Pecho más estrecho, tórax aplanado, grupa larga al igual que la cola. Su peso puede alcanzar 4 kg y el más representativo es el gato siamés.



## Tipo cobby

Regularmente tienen cabezas grandes, redondeadas y cortas, cuyas orejas suelen ser pequeñas. Son robustos, fuertes, grandes, pesados, anchos, de huesos gruesos y musculatura bien desarrollada.



## Tipo intermedio

Surge como consecuencia del cruzamiento de los dos anteriores, por lo que sus características morfológicas, como su nombre indica, se sitúan entre ambos..



*Según su tipo de pelaje*

- a) de pelo largo: hasta 15 cm.
- b) de pelo semilargo: hasta 5 cm.
- c) de pelo corto: hasta 2 cm.
- d) de pelo rizado
- e) sin pelo



# *clasificación de las razas de gatos de acuerdo a la longitud del pelaje.*

El pelaje del gato está compuesto básicamente de dos tipos de pelo.

**el pelo primario** (de protección o de guardia), que es el componente principal de la capa del animal y después se encuentra el pelo secundario (cerdas o cerdillas y lanilla, vello o pelusa). Cada pelo primario, largo, grueso y relativamente áspero, se origina de un sólo folículo y brota individualmente, mientras que los pelos secundarios, finos y más cortos, brotan en grupos o manojos alrededor de los pelos primarios.

## **El pelo secundario**

puede ser muy fino y suave (pelusa, capa lanosa) o cerdoso, con puntas gruesas y un poco más largos que la pelusa. El largo del pelo, tanto primario como secundario y la proporción con que éstos se presentan, junto con algunas variaciones en su forma y textura, son muchas veces una de las principales características individuales y especiales de las distintas razas de gatos. Algunas de estas variaciones del pelaje han surgido de manera espontánea y natural, mientras que otras han aparecido gracias a la crianza selectiva.

