

TITULO:

## Cuadro sinóptico

→  
Materia: Zootecnia de pequeñas especies

Licenciatura: medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 7

Nombre del alumno: David Morales

Fecha de entrega: 19-09-20

## Introducción:

La clasificación de los perros domésticos de tipo primitivo se desarrolló en 1897 por el señor Megnin Pierre Médico Veterinario, en cuatro tipos distintos en función de la forma de la cabeza. L: Lipoides M: Molosoides B: Bracoides G: Graioides. Stop o depresión nasofrontal Es el punto superior de inserción del hocico en el cráneo, dependiendo de la raza, puede ser más o menos marcado o inexistente. Forma de medir el cráneo de un perro La longitud se mide desde el occipucio hasta las fosas nasales y el ancho desde los puntos más externos del arco cigomático.

**Pequeñas especies**

Clasificación de los perros domésticos de tipo primitivo

Esta clasificación se desarrolló en 1897 por el señor Megnin Pierre.

Clasifico en 4 tipos en función de la forma de la cabeza.

L: Lipoides: cabeza en forma de piramide, horizontal, orejas erectas, hocico alargado, labios pequeños, la depresion naso frontal o stop muy poco marcada.

M: Molosoides: cabeza voluminosa, orejas pequeñas, hocico corto, stop pronunciado.

B: Bracoides: cabeza en forma prismatica, hocico cuadrado, orejas caidas, labios largos y colgantes.

G: Graioides: cabeza cono alargado, craneo reducido, orejas pequeñas, hocico largo y delgado, labios cortos y alargados.

Clasificación morfológica de acuerdo a la estructura del cráneo.

Se divide en 3 tipos:

Dolicocéfalo, braquicéfalo y mesocéfalo

1. cuando es más largo que ancho.

2. cuando es más ancho que largo.

3. Cuando el cráneo es igual de ancho que de largo.