

**NOMBRE DE ALUMNOS: EUGENIA
VERENICE LÓPEZ PÉREZ**

**NOMBRE DEL PROFESOR: RODOLFO
BATAZ MORALES**

**NOMBRE DEL TRABAJO: SUPER
NOTA**

MATERIA: PSICOPATOLOGÍA II

GRADO: SÉPTIMO CUATRIMESTRE

GRUPO: A

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
CHIAPAS A 17 DE SEPTIEMBRE DEL
2020**

TRASTORNO BIPOLAR Y OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS

Separados de:

- Trastorno depresivo



LOS DIAGNOSTICOS INCLUIDOS SON:

- Trastorno bipolar I
- Trastorno bipolar II
- Trastorno ciclotímico
- Otros trastornos relacionados



TRASTORNO BIPOLAR I

Este trastorno es igualitario se da en hombres y mujeres, en este trastorno se sufre de sucesos maníacos y depresivos mayores

EPISODIOS DEPRESIVO MAYOR

- Animo deprimido
- Desinterés de actividades
- Aumento de peso
- insomnio
- Perdida de energía
- Pensamientos de muerte

CLASIFICACIÓN

- Leve
- Moderado
- Grave
- Remisión parcial
- Remisión total

EPISODIO MANIATICO

- Aumento de energía
- Animo anormal
- Aumento de autoestima
- Los cambios son observables
- Fugas de ideas
- Más hablador de lo habitual
- Facilidad de distracción



Los episodios maníacos son graves y peligrosos. los episodios no se pueden atribuir a los efectos fisiologicos de una sustancia.

TRASTORNO BIPOLAR II

Están deprimidas durante períodos más largos, lo cual puede causar una alteración más importante. sufren de episodios hipomaniacos

EPISODIO HIPOMANIACO

- Aumento de energía
- Animo anormal
- Aumento de autoestima
- Los cambios son observables
- Fugas de ideas
- Más hablador de lo habitual
- Facilidad de distracción

ESTADO DE ANIMO

- Elevado
- Irritable
- Expansivo



Pueden estar llenos de chistes, juegos de palabras, desatinos,



Suelen ser enérgicos y mas rápido de lo habitual pero por lo general no es difícil de interrumpir

TRASTORNO CICLOTÍMICO

Se desarrolla en la edad adulta o en la adolescencia, de igual manera se da en hombres y m uje res, causasn probelemas emocionales

SÍNTOMAS HIPOMANIACOS

- Autoestima excesiva
- Menor necesidad de dormir
- Incapacidad para concentrarse
- Hablar más de lo habitual
- Conducta alterada etc.



CAUSAS

- Herencia
- Función del cerebro
- El entorno

CRITERIOS DE DIAGNOSTICO

- Síntomas durante dos años
- No cumplen con los criterios de trastorno bipolar
- No son por consumo de sustancia

SÍNTOMAS DEPRESIVOS

- Ganas de llorar
- Cambios en el peso
- Sentirse triste
- Cambios en el peso
- Pensar en la muerte o el suicidio
- Inquietud etc.



EFECTA EN EL ÁREA:

- Laboral
- Social
- Escolar
- En otras áreas importantes

