

UDS

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CATEDRATICO: DR. RODOLFO BATAZ MORALES

ALUMNA: DULCE GPE. VELASCO LOPEZ

MATERIA: PSICOPATOLOGIA II

ACTIVIDAD: SUPER NOTA

CARRERA: LIC. EN PSICOLOGIA

GRADO: 7TO

GRUPO: "A"

Trastorno bipolar y otros

Trastorno bipolar

El trastorno bipolar y los trastornos relacionados están, en el DSM-5, separados de los trastornos depresivos y situados entre el capítulo dedicado al espectro de la esquizofrenia y otros transitorios psicóticos y el dedicado a los trastornos depresivos, en reconocimiento de su condición de puente entre las dos clases en términos de sintomatología, historia familiar y genética.



Comportamiento habitual como:

- Episodio maniaco
- Aumento del autoestima y sentimiento de grandeza
- Disminución de la necesidad de dormir
- Mas hablador de lo habitual
- Fuga de ideas
- Facilidad de distracción
- Alteración del estado de animo

Trastorno bipolar 1



Trastorno bipolar II



CRITERIOS SIGUIENTES:

- Episodio hipomaniaco
- Un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistente
- Se caracteriza por episodios de depresión mayor, así como al menos un episodio hipomaniaco. Los episodios de hipomanía no llegan a los extremos de la manía (es decir, que no provocan alteraciones sociales u ocupacionales y carecen de rasgos psicóticos).



Trastorno ciclotímico

CON ANSIEDAD:

El rasgo principal del trastorno ciclotímico es una alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo que conlleva numerosos periodos de síntomas hipomaniacos y periodos de síntomas depresivos que son distintos entre sí.



Referencias bibliográficas:

- ANTOLOGIA UDS "PSICOPATOLOGIA II" PAG. 9-40
- <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/cyclothymia/symptoms-causes/syc-20371275>