



**Wendi Joana Gómez Gordillo**

**Bataz morales**

**Súper nota**

**Psicopatología**

**6° cuatrimestre**

**Grupo: A**

# TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DE LA INGESTA DE ALIMENTOS

## Pica.

Ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un período mínimo de un mes. la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiada al grado de desarrollo del individuo.



## Trastorno de rumiación:

El síndrome de rumiación es una enfermedad en la que las personas devuelven (regurgitan) del estómago los alimentos no digeridos o parcialmente digeridos de manera repetida e involuntaria, los mastican de nuevo y luego los vuelven a deglutir o los escupen.

síndrome de rumiación se confunde frecuentemente con la bulimia nerviosa, la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y la gastroparesia.

## Trastorno de evitación/restricción de la ingesta de alimentos.

se caracteriza por ingerir muy poca cantidad de alimento o evitar el consumo de ciertos alimentos. No consiste en tener una imagen corporal distorsionada o estar preocupado por la imagen corporal.

causa una pérdida de peso sustancial, un crecimiento más lento de lo esperado en los niños, dificultades para participar en actividades sociales normales y, a veces, carencias nutricionales potencialmente mortales.



## Anorexia nerviosa.

La restricción en la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo. los individuos con anorexia nerviosa también tienen miedo a ganar peso o a engordar, o un comportamiento persistente que interfiere con el aumento de peso, así como alteraciones específicas en relación a la vivencia y a la percepción de la constitución y el peso propios.

## Bulimia nerviosa.

Trastorno alimenticio grave caracterizado por atracones, seguidos de métodos para evitar el aumento de peso. Las personas con esta enfermedad comen compulsivamente. Luego, llevan a cabo prácticas para evitar subir de peso. La más común es vomitar (purgarse). Otras prácticas pueden ser el ejercicio físico excesivo o el ayuno.

## Trastorno por atracón.

Es una condición en la cual la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal, todo al mismo tiempo. La persona se siente fuera de control durante estos atracones. El trastorno por atracón no es lo mismo que comer mucho de vez en cuando.

Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes:

1. Ingestión, en un período determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingeriría en un período similar en circunstancias parecidas.
2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio



## Otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificado.

**Anorexia nerviosa atípica:** Se cumplen todos los criterios para la anorexia nerviosa, excepto que el peso del individuo, a pesar de la pérdida de peso significativa, está dentro o por encima del intervalo normal.

**Síndrome de ingesta nocturna de alimentos:** Episodios recurrentes de ingesta de alimentos por la noche, que se manifiesta por la ingesta de alimentos al despertarse del sueño o por un consumo excesivo de alimentos después de cenar.

## Trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificado.

Trastorno bipolar II: Es un patrón del estado de ánimo que se caracteriza por episodios depresivos mayores, alternados con episodios hipomaniacos. Es decir, la depresión se manifiesta con mayor intensidad que la manía.