

**CUADRO SINOPTICO
TRASTORNOS
NEUROCOGNITIVOS
UNIDAD III**


**Psicopatología II
Dr. Rodolfo Bataz Morales**

PRESENTA EL ALUMNO:

-Luis Ángel Flores Herrera

GRUPO, CUATRIMESTRE y MODALIDAD:

7°. Cuatrimestre “A” Psicología Escolarizado



COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS

13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

(Morales, 2020)

Delirium

- Alteración de la atención, dirección y conciencia
- Alteraciones fisiológicas
- Desarrollo de déficit adicionales

Prevalencia

- Variación de características individuales y tratamiento
- Tasa mayor de 85
- Mayor incidencia en casos de hospitalización años

Desarrollo y curso

- Desarrollo de coma, convulsiones o muerte
- 40% de tasa de mortalidad
- Fallecimiento a partir del 1er. año

Delirium por abstinencia de consumo de drogas

Predominio de criterios A y C

- Alteración receptiva (dirección, atención y conciencia)
- Alteración cognitiva adicional

Codificación

- Alcohol
- Opiáceo
- Sedante
- Hipnótico
- Sustancia desconocida

Otro delirium especificado

Predominio de síntomas característicos

- Malestar clínico significativo
- Deficiencias en áreas del funcionamiento

Características

- Incumplimiento con el cuadro clínico
- Inexigencias con el diagnóstico
- Descategorización de trastornos neurocognitivos

Delirium atenuado

Delirium no especificado

Categorización

- Sintomatología general de delirium
- Incumplimiento de categorización de trastorno neurocognitivos

Concepto

- Presentación de números de incumplimientos
- Información insuficiente para la diagnosis

TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

(Morales, 2020)

Mayor

- Declive cognitivo significativo
- Preocupación individual
- Deterioro de rendimiento cognitivo

Leve

- Declive cognitivo significativo
- Preocupación individual
- Deterioro de rendimiento cognitivo

Diferencia

Comprensión

Nivel de rendimiento

Menor

Domínios

- Atención compleja
- Función ejecutiva
- Aprendizaje y memoria
- Habilidad perceptual motora
- Cognición social

Prevalencia

- Variación de edad y subtipo etiológico
- Tasa mayor de 50 años

Desarrollo y curso

- Desarrollo infantil y adolescente
- Repercusión en función social e intelectual
- Temporal o específico

Inducción de sustancias

- Cumplimiento diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor o leve
- Persistencia delirica más allá del consumo
- Deterioro neurocognitivo
- Reproducción de déficits de acuerdo al calendario de abstinencia

Prevalencia

- Tasa de consumo mayor a los 50
- Desarrollo en función del drogodependiente

Desarrollo y curso

- Inicio de la adolescencia
- Prevalencia en consumidores mayores de 50

Debido a la enfermedad de Parkinson

- Cumplimiento diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor o leve
- Aparición en transcurso de Parkinson establecido
- Inicio incidoso y progresión rápida
- Sin especificar otro padecimiento cardiovascular

Prevalencia

- Tasa mayor entre 65 y 69
- Más comunes en hombres que mujeres

Desarrollo y curso

- Inicio en la sexta y novena decena de la vida
- Desarrollo típico con el Parkinson
- Deterioro mayor posterior

Bibliografía

Morales, D. R. (2020). *Psicopatología II*. Comitán de Domínguez, Chiapas: UDS, antologías de apoyo escolar.