

## **PATRÓN I- Percepción / Control de la Salud**

Campo de energía, perturbación del:

Capacidad adaptativa intracraneal disminuida

Conducta desorganizada del lactante

Conducta desorganizada del lactante, riesgo de:

Conducta del lactante, disposición para mejorar la organización de la:

Conductas generadoras de salud

Contaminación

Contaminación, riesgo de:

Crecimiento desproporcionado, riesgo de:

Crecimiento y desarrollo, retraso en el:

Dentición, deterioro de la:

Deterioro de la capacidad de recuperación personal

Desarrollo, riesgo de retraso en el:

Descuido personal

Disconfort

Disposición para mejorar el bienestar

Disposición para mejorar la capacidad

Disposición para mejorar el estado de inmunización

Disposición para mejorar el poder

Disposición para mejorar el proceso de maternidad

Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo

Incumplimiento del tratamiento

Manejo del régimen terapéutico, disposición para mejorar el:

Manejo inefectivo del régimen terapéutico

Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar

Mantenimiento inefectivo de la Salud

Protección inefectiva

Respuesta alérgica al látex

Respuesta alérgica al látex, riesgo de:

Retraso en la recuperación quirúrgica

Retraso en el desarrollo, riesgo de:

Riesgo de asfixia

Riesgo de caídas

Riesgo de infección

Riesgo de intoxicación

Riesgo de lesión

Riesgo de lesión perioperatoria

Riesgo de sangrado

Riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante

Riesgo de Shock

Riesgo de traumatismo

#### **PATRÓN II- Nutricional / Metabólico**

Aspiración, riesgo de:

Desequilibrio nutricional: por defecto

Desequilibrio nutricional: por exceso

Desequilibrio nutricional por exceso, riesgo de:

Deterioro de la deglución

Deterioro de la dentición

Deterioro de la función hepática, riesgo de:

Deterioro de la integridad Cutánea

Deterioro de la integridad Cutánea, riesgo de:

Deterioro de la integridad Tisular

Deterioro de la mucosa oral

Disposición para mejorar la nutrición

Hipertermia

Hipotermia

Ictericia neonatal

Interrupción de la lactancia materna

Lactancia materna eficaz

Lactancia materna ineficaz

Motilidad gastrointestinal disfuncional

*Patrón de alimentación ineficaz del lactante*

Perfusión gastrointestinal ineficaz, riesgo de:

Perfusión renal ineficaz, riesgo de:

Perfusión tisular cardiaca, riesgo de disminución de la:

Perfusión tisular cerebral ineficaz, riesgo de:

Perfusión tisular periférica ineficaz

Riesgo de glucemia inestable

Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal

Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz

Riesgo de perfusión renal ineficaz

Termorregulación ineficaz.